

♂♂ (10)	209.6	295.6	36.6	162.1	73	56.5
♂♂ (24)	226.1	310.5	38.5	164	72.1	56.7
♀	225	321	31	174	84	60
♀	212	295	34	151	70	53
♀	251.4	315	36	167	69	56
♀♀ (5)	202.9	286.6	35.8	164.1	65	50.2
♀♀ (11)	182	285.6	33.9	150.7	65.1	53.5

**亚种分化** 白胸苦恶鸟有 4 个亚种，亚种之间的区别主要是依据头部灰色部分的伸展程度，这 4 个亚种是指指名亚种 *A. p. phoenicurus*、印度亚种 *A. p. insularis*、尼科巴亚种 *A. p. midnicobaricus* 和印尼亚种 *A. p. leucomelanus*。中国有 1 个亚种，即指名亚种。文献记载的中国亚种 *A. p. chinensis* (Boddaert) 和爪哇亚种 *A. p. javanica* (Horsfield)，现在认为虽然中国亚种比爪哇亚种和指名亚种的身体大一些，但因它们和指名亚种之间无明显的颜色差异，考虑到个体间的变异和重叠，这些种群不应被分开，应视为指名亚种的同物异名。指名亚种分布于巴基斯坦、印度、马尔代夫、斯里兰卡，向东到中国东部，台湾和琉球群岛，向南经东南亚和菲律宾到大巽他群岛，北部种群在分布区南部越冬，西部种群在阿拉伯越冬，近来向北扩展到日本。

### (1) 指名亚种 *Amaurornis phoenicurus phoenicurus* (Pennant)

*Gallinula phoenicurus* Pennant, 1769, Indian Zool., 10, pl. 9 (Ceylon). Southern Travancore and Ceylon.

*Fulica chinensis* Boddaert, 1783, Table Pl. enlum. Hist. Nat., 54 (Hongkong by Stresemann).

*Amaurornis phoenicurus chinensis* Shaw, 1936, 336—337; Cheng, 1976, 177; Cheng, 1987, 190—191; Cheng, 2000, 36; Chang, 1980, 97; Zoological Division, 1983, 79—80; Yang, 1995, 338—340.

分布见种的描述。

形态和量衡度见种的描述。

**生物学** 栖息于长有芦苇或杂草的沼泽地和有灌木的高草丛、竹丛、湿灌木、水稻田、甘蔗田中，以及河流、湖泊、灌渠和池塘边，也生活在人类住地附近，如林边、池塘或公园，在江苏省湖泊周围村落附近水域的水草中，普遍有白胸苦恶鸟活动，也见于近水的水稻田、麦田、紫穗槐和野蔷薇丛中。栖息地的海拔高度从低地到 1 500 m，在云南省为 300—2 700 m。一般成对活动。性机警、隐蔽，白天在植物茂密处或水边草丛中活动。善于步行、奔跑及涉水，行走时头颈前后伸缩，尾上下摆动。平时很少见其飞翔，受惊后多奔跑隐入草丛中或短距离飞行。飞时头颈伸直，两腿悬垂，起飞笨拙，急速搨翅。发情期和繁殖期常彻夜鸣叫，鸣声似“苦恶、苦恶”，单调重复，清晰嘹亮。