

采到 1 只雄鸟。国外分布在印度，斯里兰卡和泰国，有些可能在泰国南部和马来西亚越冬。

成鸟：本亚种与采自新平、文山、腾冲、丽江等地的华南亚种的标本相比较，背部和两胁多黑褐色，而少橄榄褐色；黑褐色带斑较宽阔，头侧、颈侧及胸部的灰蓝色也较浓著；上背及腰羽多呈白色横纹而少点斑（杨岚等，1984）。腹中央羽块斑为白色，不似华南亚种之棕黄色。

量衡度 (mm, g; 据杨岚等, 1984)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂	213	270	38.5	127	47.5	41.5

(3) 台湾亚种 *Gallirallus striatus taiwanus* (Yamashina)

Hypotaenidia striata taiwana Yamashina, 1932, Tori, 7: 414 (Taiwan, China)

为台湾特有亚种，1861 年 7 月 27 日首次在台南市发现，分布于大肚溪口、云林、台南和高雄。

成鸟：体较华南亚种稍小，背部灰色较多，为橄榄灰色或灰褐色，有白色横纹。头侧、颈侧及胸部鼠灰色，略带蓝色。腹以下灰褐色，有白色横纹。

量衡度 (mm, g; 据 Hachisuka and Udagawa, 1951)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
—	145	220	32.4	115	41.7	37.7
—	—	220	39.1	117	—	39.6

生物学 栖息于多种类型的湿地中，如芦苇沼泽地、水塘、湖岸、灌溉渠、水稻田和海岸边的红树林中，也见于较干燥耕地附近的草丛和灌木丛中。在海南岛五指山海拔约 600 m 的密林中也有发现，在云南省栖息地的海拔高度为 400—2 750 m。白天隐蔽在草丛中，多在晨昏活动，善游泳和潜水，也在漂浮的植物上行走，飞行力弱，拍翅慢而吃力，不常鸣叫。杂食性，以蠕虫、软体动物、甲壳类、蜘蛛和蛴螬、蚂蚁以及其他昆虫及其幼虫为食，也吃沼泽植物的种子、嫩枝叶、幼芽、根和坚果。大部分食物从地面获得，也可跳起和站在树枝上吃植物的种子和昆虫。能用喙在软土中探食蚯蚓和昆虫幼虫，或啄起食物和拔草，不用足挖土。沿湖水边缘和水稻田、溪流、水沟觅食，在水稻田中主要吃水生昆虫。在海南剖验 3 个胃，其内含物为小蟹占 50%，小螺占 33.3%，小虾占 16.6%，金龟子、蚂蚁等少量（广东昆虫研究所动物室等，1983）。在云南剖验 1 个胃，全为鞘翅目和其他昆虫碎片（杨岚，1995）。

繁殖期在不同纬度地区有差异：印度尼西亚除 8 月和 12 月之外均可产卵，但多在 3—5 月营巢。求偶为常见的秧鸡型。雄鸟在接近雌鸟时，垂下并抖动双翅，尾竖起并不断地拍向体背，低头并将头伸直与地面平行，靠近雌鸟后，突然蹠起脚趾，挺起身