

斑，形成白色翼斑。腰、尾上覆羽黑褐色，两侧白色。中央尾羽暗褐色，外侧尾羽灰色。下体白色，但颈、上胸淡褐色，有暗色斑纹，至上腹和胁部呈箭头状。腋羽、翼下覆羽白色。两性相似。

虹膜暗褐色。嘴黑色，先端略有弯垂；嘴峰前部压扁，但并不比嘴基宽阔。腿较短，灰黑色。

量衡度 (mm, g; 据中国科学院动物研究所、复旦大学、上海师范大学标本)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (5)	40, 29	175, 167	29.5, 29.6	105, 103	38, 38	21, 21
	—, —	—, —	30, 28	106, 106	40, 39	21, 21.5
	—	155	27	104	41	20.5
♀♀ (4)	—, 38	—, 179	33, 30	109, 107	39, 40	22, 22
	—, 35	—, 167	30, 32.5	105, 108	40, 39	23, 22
∞ (4 幼)	—, —	—, —	30, 32	101, 106	38, 37	21, 21
	—, —	—, —	27, 26.5	106, 101	37, 37	21, 21

亚种分化 全世界有 2 个亚种，即指名亚种 *L. f. falcinellus* 和普通亚种 *L. f. sibirica*。二者的区别在羽色和头部侧线的粗细不同。在中国都有分布。

亚种检索表

- 上体在繁殖期棕色较差淡，上眉纹正常 指名亚种 *L. f. falcinellus*
- 上体在繁殖期棕色较艳亮，上眉纹狭窄 普通亚种 *L. f. sibirica*

(1) 指名亚种 *Limicola falcinellus falcinellus* (Pontoppidan, 1763)

Scolopax Falcinellus (sic!) Pontoppidan, 1763, Danske, Atl. 1: 623, pl. 25 (Danmark).
Limicola falcinellus falcinellus Baker, 1929, 6: 245—246; Peters, 1934, 2: 287; Dementiev *et al.*, 1951, 3:184—186; Kozlova, 1962, 2:186—188; Vaurie, 1965, 406; Ali & Ripley, 1969, 2:315; Zheng, 1976, 225—226; Prater *et al.*, 1977, 103—104; Johnsgard, 1981, 280; Hayman *et al.*, 1986 (1998), 383—384; Cheng, 1987, 242—243; Zhao, 1995, 536—537; del Hoyo *et al.*, 1996, 529—530.

迁徙季节出现在新疆（喀什、天山）。国外繁殖地在挪威、瑞典、芬兰、俄罗斯等，分布区从欧洲斯堪的纳维亚半岛至西西伯利亚（叶尼塞）。

体形略小于普通亚种。

量衡度 (mm, g; 据 Baker, 1929; Prater *et al.*, 1977)

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂	28—33(30.4)	102—109(104.8)	(35—40)	20—22(20.9)
♀♀	29—35(33.2)	103—114(109.6)	(35—40)	20—22(21.5)