

(2) 普通亚种 *Limicola falcinellus sibirica* Dresser, 1876

Limicola sibirica Dresser, 1876, Proc. Zool. Soc. London, 674 (Siberia and China).

Limicola falcinellus sibirica Baker, 1929, 6: 246—247; Peters, 1934, 2: 287; La Touche, 1931—1934, 2: 392—393; Shaw, 1936, 434—435; Dementiev *et al.*, 1951, 3:187; Kozlova, 1962, 2:188; Vaurie, 1965, 407; Ali & Ripley, 1969, 2: 317; Zheng, 1976, 225—226; 1987, 83; Hayman *et al.*, 1986 (1998), 383—384; Cheng, 1987, 242—243; Zhao, 1995, 536—537; del Hoyo *et al.*, 1996, 529—530.

分布于天津、河北（北戴河）、辽宁（鸭绿江口）、黑龙江（黑河、伊春）、上海、江苏、福建（福州）、山东、广东（广州湾）、广西（北部湾）、海南、台湾、香港（旅鸟，南部或为冬候鸟）。国外见于俄罗斯（西伯利亚、贝加尔湖区），日本，印度，菲律宾，印度尼西亚，澳大利亚等国。

形态如种的描述。

生物学 阔嘴鹬是中国罕见的旅鸟。繁殖地在俄罗斯北方苔原地区。迁徙季节常混杂于其他小型鹬群中。栖息于河口、海滨、盐田、内陆沼泽、水田等。采食甲壳类、软体动物、昆虫和杂草种子等。春季曾经在鸭绿江口有过 729 只的记录（Barter, 2002）。通常春季较多出现在香港（100—190 只）。1988 年 4 月 6 日和 1992 年 4 月 10—11 日分别记录到 320 只和 250 只，属于最多的记录。在香港约有 13 个鸟环回收记录，都是来自于澳大利亚北部（Carey *et al.*, 2001）。

O. 流苏鹬属 *Philomachus* Merrem, 1804

Philomachus Anonymous = Merrem, 1804, Allg. Lit. Zeitung, 2, no. 168, col. 542. Type species: *Tringa pugnax* Linnaeus.

cf. Kozlova, 1962, 2: 18—20; Ali & Ripley, 1969, 2:318; Johnsgard, 1981, 286.

形态 繁殖期雄性的羽色艳丽，具束状耳羽，颈羽披散如屏，面部裸露。雌雄羽色不同，大小也不同（雄性大于雌性），区别很大，种的英文名称分别为 Reeve（♀）和 Ruff（♂）。嘴峰长度适中，形直而具有柔性，上喙和下喙均具沟槽。翅长而尖，尾短而圆。尾上覆羽特长。跗蹠较长于嘴峰，跗蹠前后均为盾状鳞。外趾与中趾间具一小蹼，后趾长度适中。

地理分布 此属仅 1 种，主要分布于欧亚大陆。在中国分布在江苏、福建、西藏、新疆、台湾、香港等地。实行多配制。雄性有性表演和争斗行为，求婚方式如同鸡类。