

黄色。腿铅灰色，有时沾绿。

量衡度 (mm, g; 据中国科学院动物研究所、中国科学院昆明动物研究所、广东省昆虫研究所 *N. p. variegatus* 标本)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (8)	367 (312—450)	421 (400—445)	77 (71—86)	234 (223—243)	97 (92—108)	56.6 (54—59)
♀♀ (10)	384 (315—450)	427 (370—469)	82.4 (76—92)	238 (225—249)	99 (90—104)	58.5 (56—61)

分类讨论 据 Howard 和 Moore (1991), 有 4 个亚种; Dickinson (2003) 有 6 个亚种; 而 Peters (1934) 只列出 3 个亚种, 即指名亚种 *N. p. phaeopus*、华东亚种 *N. p. variegatus*、哈得孙亚种 *N. p. hudsonicus* Latham, 1790。近年根据线粒体 mtDNA 分析, 趋向于分为 2 个种, 而将分布于北美的哈得孙亚种另立为种 *N. (phaeopus) hudsonicus* (Zink *et al.*, 1995; Engelman *et al.*, 1998; Carey *et al.*, 2001)。二者在大小和羽毛色彩上都有区别。

亚种分化 据郑作新 (2000), 已知中国有 2 个亚种, 即指名亚种 *N. p. phaeopus* 和华东亚种 *N. p. variegatus*。

亚种检索表

- 体色较淡; 斑纹较细; 下背和腰部白色 指名亚种 *N. p. phaeopus*
- 体色较暗; 斑纹较多而粗; 下背和腰部偏褐色 华东亚种 *N. p. variegatus*

(1) 指名亚种 *Numenius phaeopus phaeopus* (Linnaeus, 1758)

Scolopax Phaeopus (sic!) Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 146 (Sweden).

Numenius phaeopus phaeopus Baker, 1929, 6: 203—204; Peters, 1934, 260—261; Dementiev *et al.*, 1951, 3: 309—313; Vaurie, 1965, 426—427; Ali & Ripley, 1969, 2: 242; Zheng, 1976, 199; Zoological Division, 1983, 91; Meyer de Schauensee, 1984, 227—228; Cheng, 1987, 213; Hayman *et al.*, 1986 (1998), 317; Howard & Moore, 1991, 72; Zhao, 1995, 482—483; del Hoyo *et al.*, 1996, 3: 503.

国内分布于广东、西藏南部、新疆、香港 (旅鸟, 漂泊鸟)。

体型比华东亚种略大。下背、腰和翼下白色。

(2) 华东亚种 *Numenius phaeopus variegatus* (Scopoli, 1786)

Tantalus variegatus Scopoli, 1786, Del. Flor. et Faun. Insubr., 2: 92 (Luzon, Philippines).

Numenius variegatus Vaughan & Jones, 1913, 362.