

亚种分化 大鸨有2个亚种，即指名亚种 *O. tarda tarda* 和普通亚种（东方亚种）*O. tarda dybowskii*，中国均有分布。

亚 种 检 索 表

头颈暗灰，翅覆羽灰色较少…………… 指名亚种 *O. t. tarda*
头颈灰色较浅，翅覆羽灰色较多…………… 普通亚种 *O. t. dybowskii*

(1) 指名亚种 *Otis tarda tarda* Linnaeus

Otis tarda Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 154 (Poland).

Otis tarda korejewi Zarudny, 1905, Orn. Monatsb., 13: 163 (Semiretchensk, Turkestan. U. S. S. R.).

分布 国内仅在新疆有分布，见于喀什、塔城、克拉玛依、布尔津、阿尔泰、福海、青河、博乐、赛里木湖、尼勒克、察布查尔、昭苏、伊犁河流域、乌鲁木齐、准噶尔盆地、北塔山、奇台、木垒、天山、吐鲁番盆地、新和（夏候鸟）（马鸣，2001）；国外分布在伊比利亚半岛、摩洛哥、土耳其、中欧和东南欧，向东到中西伯利亚的额尔齐斯河，多为留鸟。

成鸟：大致与普通亚种 *O. tarda dybowskii* 相同，但头和颈的灰色较暗，翅上的灰色较少。外侧大覆羽黑灰，内侧黑色；中覆羽白色；小覆羽、肩羽和三级飞羽与背同色（高行宜等，2000）。普通亚种上体黑色条纹较粗，外侧尾羽有更多白色。

量衡度 (mm, g; 据高行宜等, 2000)

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂	6700	1020	52	550	270	140

(2) 普通亚种 *Otis tarda dybowskii* Taczanowski

Otis Dybowskii (sic!) Taczanowski, 1874, Journ. Orn., 22: 331 (Darasun, eastern Transbaicalia).

分布 国内主要繁殖地在内蒙古呼伦贝尔盟达赉湖南部、黑龙江西部明水至肇东之间以及吉林西部草原及其相连的内蒙古科尔沁一带，越冬地在黄河以南的华北平原、淮河沿岸、长江中下游和江苏沿海滩涂等地，已知的分布地点有北京（通县）、河北（北戴河）、内蒙古（达赉湖、海拉尔、辉河地区、科尔沁右翼前旗、乌梁素海）、辽宁（本溪、大连、金县、复县、锦西、兴城、绥中）、吉林（莫莫格、镇赉、白城、洮南、向海、通榆）、黑龙江（齐齐哈尔、甘南、龙江、富裕、林甸、明水、杜尔伯特、泰来、大庆、安达、肇东）、江苏（洪泽湖西岸、泗洪、高邮湖、宝应湖、邵伯湖、盐城、徐州、连云港）、安徽（阜南、霍邱、颍上、寿县、怀远、升金湖、七里湖）、江西（鄱阳湖）、山东（黄河三角洲、莱州湾、潍坊地区）、河南（孟津、宿鸭湖、南湾水库、花园