

**(1) 普通亚种 *Porzana fusca erythrothorax* (Temminck et Schlegel)**

*Gallinula erythrothorax* Temminck et Schlegel, 1849, in Siebold, Fauna Jap., Aves, 121, pl. 78 (Japan).

分布见种的描述。

形态和量衡度见种的描述。

**(2) 云南亚种 (指名亚种) *Porzana fusca fusca* (Linnaeus)**

*Porzana fusca fusca* (Linnaeus, 1766), Syst. Nat., ed. 12, 1: 262 (Philippines); Baker, 1929, 6: 20; Peters, 1934, 2: 185; Ripley, 1977, 253—254; Howard and Moore, 1991, 63; del Hoyo et al., 1996, 3: 187; Taylor and Perlo, 1998, 411—412; Clement, 2000, 84.

*Porzana fusca bakeri* Hartert, 1917, Nov. Zool., 24: 272 (Bhim-Tal, Kumaon, India); Baker, 1929, 6: 21—22; Peters, 1934, 2: 185; Ali and Ripley, 1969, 164—165; Ripley, 1977, 253; Howard and Moore, 1991, 63; Cheng, 1976, 174; Cheng, 1987, 186; Yang, 1995, 335—336; Tang, 1996, 131; Cheng, 2000, 36.

分布在四川西部和云南西部、南部，四川见于成都和西昌，云南见于昆明、新平、景东、江城、耿马、腾冲、蒙自、金平、河口、剑川、巍山、潞西等。国外分布于从巴基斯坦和印度北部到越南、马来半岛、菲律宾和印度尼西亚西部。

成鸟：两性相似。额、头顶、头侧和胸浓栗红色，自后枕以后至尾暗橄榄褐色。颏、喉棕白色，腹及两胁亦橄榄褐色但有白色横纹，在尾下覆羽此白色横纹与橄榄褐色横纹排列更宽阔，但在有的标本则不明显。两翅橄榄褐色，翅下覆羽也有白色羽端。

幼鸟 (雌)：上体橄榄褐色但较成鸟更暗褐，头顶前部不是栗红色，在前额及颈侧出现少许栗红色羽。颏、喉白色，头侧及胸无栗红色，为橄榄褐色，但各羽有白色横斑纹。尾下覆羽有宽的白色近端横斑。尾羽暗橄榄褐色，其暗褐色更浓。幼雄与幼雌相同。

**量衡度 (mm, g; 据杨岚, 1995)**

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾
♂	70	215	21	105	48
♂	67	209	21	103	48
♂	63	198	20	97	44
♀♀ (8)	63.4	204.1	20.3	100.4	45.8
	(49—81)	(190—221)	(16—21)	(97—105)	(43—50)

**(3) 台湾亚种 *Porzana fusca phaeopyga* Stejneger**

*Porzana fusca phaeopyga* Stejneger, 1887, Proc. U. S. Nat. Mus., 10: 394 (Riu Kiu Is. Japan);