

(1) 海南亚种 *Rallina eurizonoides nigrolineata* (G. R. Gray)

Zapornia nigrolineata G. R. Gray, 1846, Cat. Bds. Nepal., 143, ex Hodgson, 1844, Zool. Misc., 86, nom. nud., in synonymy of.

Rallus superciliaris Eyton, 1845, Ann. Mag. Nat. Hist., 16: 230 (Malaysia: Malacca). nec *Rallus superciliaris* Vieillot, 1819.

Rallina eurizonoides nigrolineata Peters, 1934, 2: 172; Cheng, 1976, 171; Cheng, 1987, 183; Zoological Division, 1983, 78.

Rallina eurizonoides amauroptera Peters, 1934, 2: 172; Cheng, 1987, 183; Cheng, 2000, 35.

Rallina eurizonoides telmatophila Ripley, 1977, 161; Howard and Moore, 1991, 62; del Hoyo et al., 1996, 3: 156; Taylor and Perlo, 1998, 204; Clements, 2000, 79; Carey et al., 2001, 195.

分布在广西（桂林、北海、龙州、宁明、上思、邕宁）（留鸟），海南（吊罗山），香港（大屿山）（夏候鸟、罕见冬候鸟、旅鸟），偶见于河南（罗山）、湖南（东洞庭湖）（夏候鸟）。国外分布于缅甸、泰国北部和越南以及泰国南部和印度尼西亚的苏门答腊、西瓜哇（冬候鸟）。

形态和量衡度见种的描述。

(2) 台湾亚种 *Rallina eurizonoides formosana* Seebohm

Rallina formosana Seebohm, 1894, Bull. Brit. Orn., cl. 4: 7 (Taiwan of China); Peters, 1934, 2: 172; Ripley, 1977, 162; Howard and Moore, 1991, 62; del Hoyo et al., 1996, 3: 156; Taylor and Perlo, 1998, 204; Clement, 2000, 79; Cheng, 1976, 171; Chang, 1980, 100—101; Cheng, 1987, 183; Wang, 1991, 86.

台湾特有亚种，留鸟，分布广但数量不多，见于海拔700 m以下的水稻田和沼泽地带。分布在台中（大肚溪口），南投（埔里及雾社），嘉义平原及阿里山，高雄，台东（成功）和台北（乌来）。

成鸟：上体暗栗褐色，头顶黑褐色，头侧、颈至胸栗红色，雌鸟胸部为绿褐色。初级飞羽内翮及次级飞羽有白色横纹，外侧尾羽亦有白色横纹。腹以下至尾下覆羽为黑褐色和白色相间排列的横纹。嘴灰色，下嘴基部沾绿色，脚灰黑色。

量衡度 (mm, g; 据 Hachisuka and Udagawa, 1951; 吴志升, 1999)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂	101	218	26.6	132	60.4	43.7
♂	—	214	24.8	119	55.5	45.3