

J., 1995: 595—596; Gee *et al.*, 1948: 96.

**形态** 同科的描述。

**地理分布** 极其偶见于我国南部海岸；国外分布于印度和巴基斯坦，孟加拉国，缅甸，中印半岛南部，非洲中部热带地区，北美南部沿海，中美和南美洲的热带地区及南美亚热带地区沿海。

本属鸟类有 3 种，它们是黑剪嘴鸥 *Rynchops niger*，非洲剪嘴鸥 *Rynchops flavirostris* 和剪嘴鸥 *Rynchops albicollis*。在我国有记录的是剪嘴鸥 *R. albicollis*。

### 1. 剪嘴鸥 *Rynchops albicollis* Swainson, 1838 (图版 IV: 8)

*Rynchops albicollis* Swainson, 1838 (1837), Anim. Menag., 360 (India).

别名：白领剪嘴鸥，印度海鸥，剪嘴。

英文名：Indian Skimmer, Scissors-bill.

**地理分布** 国内偶见于我国南部海岸（迷鸟）；国外分布于巴基斯坦东部，印度北部、中部和东部，孟加拉国，缅甸西部以及柬埔寨南部，可能还在尼泊尔和老挝南部繁殖。

**鉴别特征** 嘴长而粗大，基部较宽，端部细，略向下弯，下嘴明显长于上嘴，下嘴前端侧扁似薄刀形，嘴红色，端部转黄色；头顶至枕黑色，上体和翅黑褐色；额、嘴基、颊、颈侧和后颈及下体均为白色；尾呈凹尾状；翅长而尖；脚短小，红色。

**形态** (据 Harrison, 1983; Grimmett, 1998)

成鸟夏羽：头顶和枕黑色，与白色的额和领圈形成对比；黑色的上背和白色的下体形成对比。腰和尾上覆羽白色，中央有褐色细纹，尾羽和下体白色。翅上面几全黑，初级飞羽大体黑色，最内侧初级飞羽的羽端和次级飞羽端部为白色，飞翔时显示初级飞羽黑色，翅下面和翅后缘白色。

成鸟冬羽：上体羽色更褐更暗，其余同成鸟夏羽。

幼鸟：后头、枕和后颈褐色，羽端略带黑色和白色。上背大部分为褐色，羽缘皮黄色；腰和尾上覆羽白色，羽端沾褐色。初级飞羽最内侧羽端黄白色。下体和尾白色。

虹膜褐色；嘴橘红色，尖端黄色，上嘴短，下嘴长，略向下弯曲；幼鸟嘴暗黄，尖端黑色；脚鲜红色。

**量衡度** (mm, g; 据 Ali and Ripley, 1969; del Hoyo *et al.*, 1996)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♀ (15)	—	380—430	58—75	344—398	104—112	24—26

**亚种分化** 无亚种分化。

**生物学** 剪嘴鸥主要栖息于内陆的大型江河湖泊中，也在海岸边活动。是中国的迷

鸟。喜欢靠近水面上下飞翔，频繁的贴近水面，边飞边用下嘴在水面“耕犁”，当下嘴触及食饵时，嘴部快速关闭。是群居性的鸟类。取食、营巢、游荡均在一起。习性为部分夜间活动，大多数取食活动发生在清晨或黄昏，当水体平静食饵上升到水面时发生“耕犁”觅食活动。偶尔也会站在浅水中以嘴选取食物。鸣声似尖厉的“吱吱”叫声。食物主要为小鱼和小型甲壳类动物。

剪嘴鸥在国内除了 Gee 等 (1948) 记载为冬季偶见于中国南部海岸外，尚未有过确切的记录。是极其罕见的鸟。

## (IV) 海雀科 Alcidae

善游泳和潜水的北方海洋中的特殊类群鸟类，中小型个体。嘴短或适中，侧扁，粗壮或细狭；有的种类繁殖期具鲜明的色彩和各种角质突起的饰物。头大，颈短而分界不清晰，体躯粗笨结实，短而肥壮。翅小，具特别短的次级飞羽，折翼时翼端不及尾端。尾短。脚亦短，位于体后，站立时身体几乎垂直，体重支撑在足和尾上，有的种类脚的颜色鲜明，趾间具蹼，后趾缺如或退化，爪强有力。羽衣黑色、褐色或灰色，有 2 个种具有红褐色或皮黄色；大多数种类下体白色，但许多种的颈和喉在繁殖期为黑色，有的翅上具一白斑。羽毛紧密，两性相似。

栖息于北半球的亚极地和冷水水域，有些种类迁徙。

远洋鸟类，对潜水和游泳生活的适应使之外形略似企鹅。快速直线飞行。在水下游泳时使用双翅。群居性，在海面上常与鸥类聚成大群。叫声有咕噜声、呜咽声、吠叫声及带有丝丝音的声音。

食物主要为鱼类，还有甲壳类、软体动物、蠕虫和藻类。

集群繁殖，有时成极大的群体，营巢于海岛、岩礁的岩石突出部分及裂缝和洞穴，无巢材或有巢材而缺衬垫，每窝产卵 1—2 枚，卵白色至深皮黄色或浅绿色及蓝色；呈纯色或有浅色至深色的斑点和褐色的不规则线纹。两性均孵卵或仅雌鸟孵卵。雏鸟半留巢性，体被绒羽，两性育雏，孵出后 18—25 天进入海中，幼鸟具飞翔能力时成群飞向海洋。

对海雀科鸟类的分类，学者有不同的看法。在全世界有 13 属 23 种 (Peters, 1934)；12 属 22 种 (Howard and Moore, 1991)；12 属 23 种 (Monroe; Sibley, 1993)；11 属 22 种 (del Hoyo *et al.*, 1996) 或 11 属 23 种 (Clements, 2000)。在中国有 3 属 4 种 (郑作新, 2000, 2002)。

### 属 检 索 表

1. 次级飞羽均具白色羽端 ..... 斑海雀属 *Brachyramphus*