


 图 246 乌燕鸥 *Sterna fuscata* Linnaeus

量衡度 (mm, g; 据华南濒危动物研究所标本)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (1)	200	400	41	280	160	28
♀ (1)	175	390	41	300	170	22

亚种分化 Peters (1934) 把全世界分布的乌燕鸥分为 6 个亚种, 而 Harrison (1983) 和 Howard and Moore (1991) 则列出 7 个亚种, 最近的 del Hoyo *et al.* (1996) 则认为有 8 个亚种。7 个亚种的分化比 6 个亚种的多出 *S. f. somaliensis* 1 个亚种, 而 8 个亚种的分化法则在 6 个亚种的基础上多出 *S. f. infuscata* 和 *S. f. luctuosa* 两个亚种, 却没有列入 *S. f. somaliensis* 亚种。它们是 *S. f. fuscata* 分布于墨西哥湾、南北卡罗来纳和佛罗里达、罗伊斯安那和德克萨斯、几内亚湾和南大西洋的一些岛屿上; *S. f. nubilosa* 分布于红海南部、亚丁湾和印度洋, 向东至琉球群岛和菲律宾; *S. f. infuscata* 可能分布于印度尼西亚中部; *S. f. serrata* 分布于新几内亚、澳大利亚和新喀利多尼亚; *S. f. kermadeci* 仅见于新西兰克马德克群岛; *S. f. oahuensis* 分布于小笠原群岛至夏威夷及南太平洋; *S. f. crissalis* 分布于墨西哥西部外海岛屿和中美洲, 南至加拉帕戈斯群岛; *S. f. luctuosa* 见于智利的胡安·费尔南德斯群岛。在我国东南部沿海的亚种是华东亚种 *S. f. nubilosa*。

(1) 华东亚种 *Sterna fuscata nubilosa* Sparrman, 1788

Sterna nubilosa Sparrman, 1788, Mus. Carls. 3, no. 63 (Finland, error; = "India Orientalis", ex Sundevall).

国内分布详见种的记述; 国外分布于红海南部, 亚丁湾, 印度洋的一些群岛如马斯卡林群岛, 塞舌尔群岛, 拉克代夫群岛, 马尔代夫群岛, 安达曼群岛以及菲律宾苏禄海和琉球群岛等地。