

(1) 华南亚种 *Turnix suscitator blakistoni* (Swinhoe)

Areoturnix blakistoni Swinhoe, 1871, Proc. Zool. Soc. London, 401 (Guangzhou, Guangdong, China).

Turnix suscitator blakistoni Baker, 1928, 5: 448; Peters, 1934, 146; La Touche, 1931—1934, 2: 266—268; Vaurie, 1965, 364; Howard and Moore, 1991, 57; del Hoyo *et al.*, 1996, 3: 54; Grimmett, 1998, 379; Clements, 2000, 76; Cheng, 1976, 163; Cheng, 1987, 172; Yang, 1995, 322—324; South China Insitute, 1991, 31—32.

Turnix suscitator plumbipes, Bird Group, 1980, 36; Cheng, 1987, 172.

分布在云南、福建、江西 (遂川)、广东、广西、海南及贵州, 留鸟。

形态和量衡度见种的描述。

(2) 台湾亚种 *Turnix suscitator rostrata* Swinhoe

Turnix rostrata Swinhoe, 1865, Ibis, 543 (Taiwan, China).

Turnix suscitator rostrata Swinhoe, 1863, 398; La Touche, 1931—1934, 2: 266—268; Peters, 1934, 146; Vaurie, 1965, 364; Howard and Moore, 1991, 57; del Hoyo *et al.*, 1996, 3: 54—55; Clements, 2000, 76; Cheng, 1976, 162; Cheng, 1987, 172; Chang, 1980, 92—93; Chen, 1984, 265—268; Yang, 1995, 322—324; South China Insitute, 1991, 31—32.

为台湾特有亚种, 普遍分布在平地至海拔 1 200 m 之间干燥的杂草地区。

雌性成鸟: 背部的红褐色较雄鸟更浓, 密布黑色横纹和虫蠹斑, 颈、喉及上胸为黑色, 下胸皮黄色有黑色横纹; 腹部中央色较淡; 嘴、脚苍灰色。

雄性成鸟: 颈、喉及上胸白色而非黑色。

幼鸟: 虹膜黑褐色, 嘴黑, 嘴角黄色。眼周和耳周裸皮铅灰色。体羽淡赭色, 上体有黑色和栗褐色纵纹并有斑点。

量衡度 (mm, g; 据台湾自然科学博物馆的标本)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀ (6)	44.6	138.0	14.0	85.3	31.1	27.2
	(42.7—46.7)	(130—142)	(13.3—14.4)	(78—88)	(30—32)	(25—30)
♂♂ (4)	55.8	140.0	12.5	80.8	29.6	25.1
	(54.5—58.3)	(140—140)	(11.8—13.5)	(77—88)	(26.8—31.8)	(24.9—25.5)

生物学 见于平原和丘陵地的稻田、耕作区附近或山坡村旁的竹林中, 垂直分布海拔云南为 700—1 300 m, 台湾为平地至 1 200 m。喜欢沙土, 常在开阔地边缘或水边活动。在陆地的枯枝落叶间觅食, 吃草籽、嫩芽和昆虫等, 在横断山区剖验 3 个鸟胃, 见有鞘翅目甲虫 (2 次), 膜翅目蚂蚁 (2 次), 浆果 (1 次), 动物性食物占 68.5%, 植物