

虹膜黄色;嘴黄绿;爪黑褐色

**量衡度:**

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(6)	152 (140—170)	222 (202—256)	21	153.8 (151—156)	79.4 (75—82)	26 (25—27)
♀♀(4)	162 (160—167)	226.2 (217—240)	21.5 (21—22)	157.2 (154—164)	80.7 (78—85)	27.2 (27—28)

**亚种分化** 纵纹腹小鸮共有 12(或 14)个亚种,其中分布于国内的有 4 个。

### 亚 种 检 索

1. 体形较大,翅长 175 毫米以上..... 西藏亚种 *A. n. ludlowi* (202)  
体形稍小,翅长在 175 毫米以下..... 2
2. 上体淡砂褐色,头上白斑较粗,背上白斑大而模糊,下体褐色纵纹较淡而较少.....  
新疆亚种 *A. n. orientalis* (202)  
上体暗砂褐色,头上白斑较细,背上白斑细而明显,有时沾棕色,下体褐色纵纹较暗较多..... 3
3. 体形较小,翅长 6♂♂ 153.8(151—156), 4♀ 157.2(154—164) 毫米.....  
普通亚种 *A. n. plumipes* (202)  
体形较大,翅长 5♂♂ 165.2(166—167), 8♀ 171.7(167—175) 毫米.....  
青海亚种 *A. n. impasta* (203)

**(1) 普通亚种 *Athene noctua plumipes* Swinhoe**

国内分布于黑龙江哈尔滨、齐齐哈尔,辽宁黑山、建平、辽阳、柳树屯,内蒙古呼伦贝尔盟、呼和浩特、伊克昭盟,宁夏贺兰山,河北,山西,陕西南部,河南,江苏徐州,贵州威宁。国外见于苏联外贝加尔湖地区的西南部,阿尔泰山,蒙古,朝鲜等。

形态详见上文。

*Athene plumipes* Swinhoe, 1870, Proc. Zool. Soc. London, 448 (模式产地: 北京南口)。

**(2) 新疆亚种 *Athene noctua orientalis* Severtzov**

国内分布于新疆尉犁、喀什、莎东、皮山。另外还见于苏联中亚地区的塔吉克,天山山脉,阿尔泰山。

本亚种较 *plumipes* 亚种羽色稍浅,呈淡沙黄褐色,头顶上白色条纹粗长,不呈水滴状;上体白斑较大,但常被砂褐色羽缘所掩盖,因而显得模糊;下体浅棕白色,胸、胁部棕色纵纹浅淡,较细,较稀。

**量衡度:**

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	128,132,	204,211,	18.5,20	155,152	97,96	27,32

*Athene orientalis* Северцов, 1873 (1872). Вертик. и горизон. распрост. Туркест. живот., 115 (模式产地: 苏联天山山脉)。

*Athene noctua orientalis*, 钱燕文等, 1965, 86.

**(3) 西藏亚种 *Athene noctua ludlowi* Baker**