

Bubo bubo inexpectatus "Sushkin" Dementiev, 1932 (30 Jan., 1933, *Alauda*, 4(2) :394 (模式产地: 东北).

(3) 华南亚种 *Bubo bubo kiautschensis* Reichenow

国内分布于甘肃南部、陕西南部、山东、河南,南至福建、广东、广西,西抵四川北部松潘、云南东南部。国外见于朝鲜及日本福江岛和奄美大岛。

本亚种十分暗,较多棕色,上体浓密的褐色斑纹较少,而有狭细的黑褐色干纹,体形较东北亚种 *ussuriensis* 稍小。

量衡度:

性别	体长	体重	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀♀(2)	—650	2250,—	51,52	430,431	265,260	79,80
♂(2)	—	—	52	430,430	245,240	76,79

Reichenow (1903) 发表的 *setschuanus* 新亚种, 是基于采自四川的单个标本命名的。Hartert (1913:p.966) 曾查看过这个标本,认为是 *kiautschensis* 的同物异名; Vaurie (1960) 认为 Hartert (1913) 把采自长江下游江西九江的标本,订为 *swinhoei* 新亚种,也是本亚种的同物异名,因为这些标本与福建和山东标本对比,看不到什么差别。La Touche (1927) 根据一个采自云南未成长的幼鸟提出的 *jarlandi* 新亚种是不能成立的,一般认为是本亚种的同物异名。

Bubo bubo kiautschensis Reichenow, 1903, *Orn. Monatsb* (模式产地: 山东胶州)。

Bubo bubo setschuanus Reichenow, 1903, *Orn. Monatsb.*, 11:86 (模式产地: 四川)。

Bubo bubo swinhoei Hartert, 1913, *Vög. pal. Faun.*, 2:966 (模式产地: 江西九江)。

Bubo bubo jarlandi La Touche, 1921, *Bull. Brit. Orn. Cl.*, 42:14 (模式产地: 云南蒙自)。

Bubo bubo kiautschensis, 郑作新等, 1973, 89—90。

(4) 西藏亚种 *Bubo bubo tibetanus* Bianchi

分布于青海南部玉树,四川德格、石渠、理塘,云南德钦,西藏南部江孜、岗巴、亚东及拉萨。

羽色较 *kiautschensis* 亚种浅淡,棕色较少,灰色较多,体形较大;和东北亚种 *ussuriensis* 近似,但颈及胸部暗褐色斑纹比较浓密和宽阔。

李德浩等 (1965) 在青海南部扎多,曲麻莱采到 2 个雌鸟,鉴定为 *hemachalana* 亚种,这两个标本均采自 *tibetanus* 亚种模式产地玉树附近。Dementiev *et al.* (1951) 把 *tibetanus* 作为 *hemachalana* 亚种的同物异名,但 Vaurie (1960) 认为 *hemachalana* 亚种,较 *tibetanus* 更浅淡,上体褐色甚少,暗色花纹减少,而白色斑纹增多,下体也较浅淡,褐色虫蠹纹不那么浓密,因而认为西藏亚种 *tibetanus* 应予承认。

翅长 2♂♂ 450, 460, 2♀♀ 495, 502 毫米(据 Vaurie, 1960)。

Bubo bubo tibetanus Bianchi, 1906, *Bull. Brit. Orn. Cl.*, 16:69 (模式产地: 青海玉树)。

Bubo bubo hemachalana, 李德浩, 1965。

Bubo bubo tibetanus, 郑作新 1976; 郑作新等, 1983, 128。

(5) 天山亚种 *Bubo bubo hemachalana* Hume