

- (458.6)毫米..... 北疆亚种 *B. b. yenisseensis*(176)
- 2.体色较 *yenisseeensis* 为暗,上体黑褐色纵纹较多,下体淡棕色近黄,翅长(12♂♂)430—475(447.5),  
(6♀♀)460—478(47.5)毫米..... 东北亚种 *B. b. ussuricensis*(176)
- 3.体色较 *ussuriensis* 为暗,棕色较深,黑褐色纵纹多而显著,翅长(5♂♂)410—448(428.8)(20♀♀)  
440—485(455.5)毫米..... 华南亚种 *B. b. kiautschensis*(177)
- 4.体色较 *kiautschensis* 为浅,棕色较少,多灰色,与 *ussuriensis* 体色相似,但后颈和胸部的黑褐色纵纹  
较多而著,体形亦较大,翅长(13♂♂)450—485(466),(9♀♀)490—505(498.8)毫米.....  
西藏亚种 *B. b. tibetanus*(177)
- 5.体色较 *tibetanus* 为浅,而与 *yenisseeensis* 相似,但上体较黄,少灰色,腰,外侧尾羽及尾下覆羽黄色较  
浓,下体近白色..... 天山亚种 *B. b. hemachalana*(178)
- 6.体色较 *hemachalana* 平均暗些,茶黄色较少,较多灰色,翅长(13♂♂)415—482(450.5),(22♀♀)  
455—508(483.8)毫米..... 准噶尔亚种 *B. b. auspicabilis*(178)
- 7.体色最浅黄,暗褐色条纹及虫蠹斑较少,翅长(2♂♂)450—455,(4♀♀)465—475(471.2)毫米.....  
塔里木亚种 *B. b. tarimensis*(178)

### (1) 北疆亚种 *Bubo bubo yenisseensis* Buturlin

国内仅见于新疆北部。国外见于苏联西伯利亚中部,从叶尼塞河、阿尔泰地区到外贝加尔湖西部一带。

此亚种是国内鵟鴞各亚种中羽色最浅淡的,体羽呈灰茶黄色,暗色斑纹较著,但数量  
少;胸部条纹较阔,并延伸到腹部,腹部横斑比较粗著,但数量较少。

翅长6♂♂458.6(435—470);13♀♀491.4(475—510)毫米(据 Vaurie, 1963)。

*Bubo bubo yenisseensis* Бутурлин, 1911, Орн. Вестн., 28 (模式产地: 西伯利亚中部克拉斯诺亚尔斯克)。  
*Bubo bubo zaissanensis* Xах об, 1915, Орн. Вестн., 224 (模式产地: 新疆)。

### (2) 东北亚种 *Bubo bubo ussurensis* Poliakov

国内见于东北三省、内蒙古伊克昭盟、河北及山西(留鸟)。国外见于苏联西伯利亚东  
南部、外贝加尔湖西部,蒙古东北部。

形态详见前文。

La Touche (1925—34, II: 113—114) 根据 Bangs 的描述,把采自北京附近九龙山  
及山西的一对标本,用 Sushkin 一个未正式发表的“*inexpectatus*”名称,命名为新亚种,  
认为此新亚种近似 *yenisseeensis* 亚种,但较浅淡,特别是下体缺少锈红色,腹、胁、体侧及  
腿为十分浅的赭色。我们曾用北京近郊标本与采自辽宁四台子标本对比,没有发现有什  
么不同; Dementiev (1933) 也用 *inexpectatus* 命名东北标本,根据优先律原则,我们同  
意 Vaurie (1960) 意见,把这两个名称,作为 *ussuriensis* 亚种的同物异名。

*Bubo bubo ussurensis* Поляков, 1915, Орн. Вестн., 44; nom. nov. for:

*Bubo bubo doerriesi* “Seeböhm” Бутурлин, 1910, Наша Охота, 4:78 (模式产地: 乌苏里江流域); nec  
*B. doerriesi* Seeböhm, 1895.

*Bubo bubo dauricus* “Sushkin” Штегман, 1929, Ежег. ЗоолМуз. Акад. Наук, 29:178(模式产地: 苏  
联).

*Bubo bubo inexpectatus* “Sushkin” Bangs, Jan. 1932, in La Touche, Handb. Bds. East. China, 2(2):  
113 (模式产地: 河北九龙山)。