

2. 体羽一般为棕褐及黑褐色..... 鸣鸮 *B. bubo*(174)
 体羽灰褐色..... 乌鸣鸮 *B. coromandus*(180)

Bubo Dumeril, 1804, Zool. Analytique, 34. 模式种: *Strix bubo* Linnaeus.
 参阅 Baker, 1927, 4:412—420; La Touche, 1931—34, 2:113—118; Ali et Ripley, 1969, 3:271—282;
 Burton, 1973, 72—90; 郑作新, 1976, 301—303; de Schauensee, 1984, 267.

5. 林鸣鸮 *Bubo nipalensis* Hodgson

别名 林鹰鸮。

英文名 Forest Eagle Owl.

地理分布 国内仅见于四川雅安、宝兴、会东及云南东南部河口, 为罕见的留鸟。国外见于印度、尼泊尔、锡金、不丹、斯里兰卡、缅甸、泰国、老挝、越南。

鉴别特征 外形和鸣鸮相似, 但体形稍小, 头顶上有显著的耳簇羽, 上体深褐色, 多数羽缘杂有白色或浅皮黄色; 下体皮黄色, 腹部中央白色, 在喉及胸部有深褐色横斑, 并遍布粗大点斑, 脚全部披羽。

形态(据指名亚种 *B. n. nipalensis* 标本) 成鸟(春羽)眼先, 颊和颏等披以淡褐色近白的须状羽, 但眼先羽干为黑褐色, 在颈部转为白色。耳羽发达, 内翈大都棕白而杂有黑褐色斑, 或为黑褐色而有棕色缀黑的横斑; 外翈非纯黑褐, 亦杂有棕色缀黑的横斑, 上体包括内侧肩羽以及覆羽均黑褐色, 头顶色特浓, 微具隐约可见的棕色横斑。背羽及翼上的小覆羽, 均杂以棕色横斑和羽缘, 向后尤为显著, 尤其是腰羽和中覆羽及大覆羽等; 这些棕色部分均缀以黑褐色, 因而斑杂成云石状。外侧肩羽棕色而具黑褐色的横斑, 小翼羽和初级覆羽几纯黑褐色, 初级飞羽黑褐而具淡褐色的横斑和羽端斑, 次级飞羽横斑较著, 且散缀以黑褐色。尾羽亦黑褐色, 缀以棕色横纹和棕白色羽端, 横纹和羽端均或多或少地散缀以云石状黑褐色斑点, 外侧尾羽的内翈上棕色横斑较鲜亮几成纯色, 下体白, 稍沾棕色, 在胸部特别显著。喉及胸均杂以暗褐色横斑, 至腹和尾下覆羽则缩短为“V”形斑。覆腿羽白色, 密杂以暗褐色横斑, 腋羽和翼下覆羽的色调和胸部相似, 但满布以暗褐色“V”形斑纹。

虹膜褐色; 嘴腊黄色; 趾暗黄, 爪角色沾红, 渐转为黑色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	—	630	50	451	266	60

亚种分化 林鸣鸮共有2个亚种, 即指名亚种 *B. n. nipalensis* 和斯里兰卡亚种 *B. n. blighi*, 仅指名亚种分布于我国。

(1) 指名亚种 *Bubo nipalensis nipalensis* Hodgson

分布和形态见上文。

Bubo nipalensis Hodgson, 1836, As. Res., 19:172 (模式产地: 尼泊尔).

Bubo n. nipalensis, 郑作新、潘清华等, 1957, 37—38.

生态 林鸣鸮是典型林栖鸟类, 在四川, 栖息在2200至3000米左右的常绿阔叶林内; 在云南河口, 则栖息在580米的热带雨林中。白天躲藏在茂密的树枝叶丛内, 黄昏时