

鉴别特征 体略大于家鸽；翅长超过 190 毫米；翼下覆羽黑色。

形态（依据广东大陆所采指名亚种标本）

成鸟 除两翅及肩、肩内侧为栗色外，通体包括翼下覆羽黑色，头至胸有紫蓝色亮辉及亮黑色的羽轴纹，胸至腹或有绿辉；尾羽具铜绿色反光，初级飞羽及外侧次级飞羽具暗晦色羽端。冬时上体羽干淡色，下体具横斑，很似幼鸟，但尾羽无横斑。

幼鸟（4, 5月采自广东从化7月8日采自广东佛冈） 上体布以暗褐色和红褐色横斑，羽轴灰白色；腰部杂以黑褐色、污白色至棕色横斑；尾部具一系列苍灰或灰棕色横斑；下体暗褐色，具狭形苍白色横斑。随着幼体的成长，整体黑色比例增大，横斑减小。离巢前的幼鸟翅上亦满布淡棕白色横斑。

虹膜赤红色（成鸟）或灰蓝至暗褐色（幼鸟）；嘴、脚均黑色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(18)	266.6 (250—280)	483.7 (400—490)	35.5 (34—37.2)	216.5 (204—228)	270 (245—281)	55.5 (53—59)
♀♀(7)	376.1 (280—392)	496 (485—520)	37.7 (34—41)	211 (202—226)	261.4 (252—288)	56 (54—58)

亚种分化 褐翅鸦鹃共有 8 个亚种，中国有 2 个亚种。

亚 种 检 索

体形较大，翅长一般超过 200 毫米..... 指名亚种 *C.s. sinensis*
体形较小，翅长一般不及 200 毫米..... 云南亚种 *C.s. intermedius*

(1) 指名亚种 *Centropus sinensis sinensis* (Stephens)

留居浙江宁波、福建、广东、广西和贵州极南部。另外，自喜马拉雅南麓至印度中部也有分布。

形态和量衡度见种的描述。

Polophilus sinensis Stephens, 1815 in Shaw's Gen. Zool., 9(1): 51 (模式产地：浙江宁波)。

Centropus sinensis sinensis, Baker, 1927, 4: 189—191; La Touche, 1931—34, 2:57—58; Peters, 1940, 4: 70; Ali et Ripley, 1969, 3: 240—242; 郑作新, 1976, 293; de Schauensee, 1984, 264.

(2) 云南亚种 *Centropus sinensis intermedius* (Hume)

留居我国云南西部至南部西双版纳及海南。国外向南至中南半岛，西至印度阿萨姆。

整体羽色与指名亚种无区别，只体形较小，翅长一般不及 200 毫米。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(10)	289 (260—340)	497.2 (480—511)	36.5 (33—38)	192.2 (190—195)	252 (248—268)	54.1 (50—56)
♀♀(10)	252.8 (230—272)	478 (430—505)	35 (33—38)	183.1 (182—196)	251.7 (235—268)	56.3 (53—57)