

经济意义 嗜吃松毛虫和白蚁,为森林益鸟。此外,它又是较美观的鸟,可供饲养。

Cuculus coromandus Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1: 171 (模式产地: 印度科罗曼德尔)。

Clamator coromandus, Baker, 1927, 4: 170—171; La Touche, 1941—34, 2: 53—54; Peters, 1940, 4: 12;

Ali et Ripley, 1969, 3: 12—14; 郑作新等, 1973, 84; 郑作新, 1976, 281—282; 张万福, 1980, 163, 广东省

昆虫研究所等, 1983, 125; de Schauensee, 1984, 262.

2. 斑翅凤头鹛 *Clamator jacobinus* (Boddaert)

别名 斑凤头鹛、斑凤头郭公。

英文名 Pied-winged Crested Cuckoo.

地理分布 见于西藏南部(6月)。国外分布于非洲及土耳其、巴勒斯坦、阿富汗、印度、斯里兰卡、缅甸等。

鉴别特征 和前一种区别在羽冠较短;翅黑色而具一大白斑;尾具白端;下体大致白色。

形态(依据指名亚种)

成鸟 上体及头侧、翅、尾等黑色,具铁绿色亮辉,初级飞羽具一白色带斑贯通内、外翮(第一枚仅见于内翮);尾羽端部具白斑,两侧者形宽,中央者较狭;下体白色、淡灰白或略带棕黄色。

幼鸟 与成鸟对应部分的褐色为黑色替代;尾白斑沾棕且形小;颊、喉棕灰;翼上覆羽具棕灰色羽缘;羽冠不发达。

虹膜褐至红褐色;嘴黑色;脚灰蓝黑色。

量衡度(据 Ali et Ripley, 1969):

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(12)	25—28	146—155	156—176	25—28
♀♀(8)	25—28	144—155	156—169	25—28

亚种分化 斑翅凤头鹛有2个亚种分化,我国只有1个亚种。

(1) 指名亚种 *Clamator jacobinus jacobinus* (Boddaert)

国内分布如前述,国外分布自巴基斯坦、印度、斯里兰卡东至缅甸。

形态及量衡度同种的描述。

Cuculus jacobinus Boddaert, 1783, Tab. Pl. enlum., 53(模式产地: 印度科罗曼德尔海岸)。

Clamator jacobinus jacobinus, Baker, 1927, 4: 167—169; Peters, 1940, 4: 13; Ali et Ripley, 1969, 3:

197—198; 郑作新, 1976, 282; 郑作新等, 1983, 123; de Schauensee, 1984, 262.

生态 是林栖性鸟类,在各种环境的树林、竹、灌丛均可见到,尤其是在旱地的、较开阔地带的疏林中更常见,飞行速度较前一种慢;叫声为二声一度,带粗糙的金属声,偶尔也发出富有音韵的鸣声。食性与红翅凤头鹛相似。其繁殖情况在中国未获得资料, Baker (1927) 及 Ali et Ripley (1969) 谓它们寄卵于低地和山脚繁殖的鹛类 *Timalis* spp., 噪鹛 *Garrulax* spp., 鹎类 *Pycnonotus* spp., 地鸫类 *Geocichla* spp., 雀鹛类 *Alcippe* spp., 伯劳类 *Lanius* spp., 燕尾类 *Enicurus* spp. 等的巢中,自1月至9月均见到斑翅凤头鹛