

21. 黑果鸽 *Columba janthina* Temminck

英文名 Black Wood Pigeon.

地理分布 仅于夏季(5—10月间)偶见于山东威海附近(据 Jones, 1911)。在国外, 主要分布于日本南部岛屿, 南抵琉球群岛及硫黄列岛 (Valcano) 和小笠原群岛 (Bonin)。

鉴别特征 通体黑色; 头顶闪紫, 后颈显着绿色莹光, 体形较一般野鸽为大, 全长达 400—430 毫米。

形态(据 Salvadori, 1893)

雄性成鸟 通体石板黑色; 在头顶、背及腰等处的羽缘, 均具紫色金属反光; 在后颈和前胸等转为金属绿色; 翅上覆羽及下体余部, 闪光却不很强, 而随着光线的不同显得绿色或紫色; 下背、腰、两肩及翅上覆羽等还具青铜色的光辉; 翅下覆羽、飞羽及尾羽等均石板黑色, 飞羽下面更褐, 外翮稍微缘以褐色。

雌鸟与雄相同, 仅是羽色或许并不那样鲜艳。

虹膜褐; 嘴暗蓝色; 脚与趾均红。

量衡度 (据黑田长礼, 1935):

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♀	18—21	213—242	153—177	29.5—35

亚种分化 计有 3 个亚种, 即指名亚种 *Columba j. janthina* Temminck, 产于日本主岛的南部岛屿及琉球群岛北部; *C. j. stejnegeri* (Kuroda), 产于琉球群岛南部; *C. j. nitens* (Stejneger), 分布于小笠原群岛和硫黄列岛。

我国山东沿海偶见的黑果鸽, 就是指名亚种, 已详述于前面。

生态 栖于多林小岛上的稠密常绿林间, 在树枝间或地面上活动。飞行似鸦, 日人常称为鸦鸽。食物以山茶 (*Camellia*) 种子为主, 可能兼吃其他种子、果实等。

营巢树枝间, 但据 Yamashina (1961), 却在树洞间或在岩崖上。它在山东繁殖从 5 月至 7 月间, 巢在树上, 曾采得 3 个卵, 其大小为 1.36×1.04 , 1.39×1.04 , 1.32×1.04 英寸¹⁾(据 Jones, 1911)。

Columba janthina Temminck, 1830, in Temminck et Laugier, pl. col. Ois., 86, 图版 503(模式产地: 日本); Salvadori, 1893, 310—311; Peters, 1961, 69; Vaurie, 1965, 548—549; Goodwin, 1973, 88—89; 郑作新, 1976, 268; de Schauensee, 1984, 250.

Columba janthina, 1911, 682.

E. 鸚鵡属 *Macropygia* Swainson, 1837

形态 上体或下体或则上下体通常具有黑色的细横斑, 犹如杜鹃。头小, 嘴细, 犹如

1) 1 英寸=0.0254米, 下同。