



图9 雪鸽 *Columba leuconota* 的分布
1. *C. l. gradaria* ○ 2. *C. l. leuconota* ●

(2) 华西亚种 *Columba leuconota gradaria* Hartert

分布于甘肃西北部,青海东部至南部,四川北部、西部及西南部,云南西北部,西藏东部昌都、芒康,东南部察隅、林芝,南部错那、隆子以至珠穆朗玛峰地区。

形态和量衡度见上文。

Columba leuconota gradaria Hartert, 1916, Nov. Zool., 23:85 (模式产地:四川北部松潘)。

生态 雪鸽的习性与一般野鸽,如岩鸽 (*Columba rupestris*) 等相似,不过大多栖息于海拔高处,如在四川、西藏昌都地区常在海拔 2 900—3 900 米处,在西藏西部普兰县只在海拔 3 700 米处遇见,它们出没于岩石和土坎陡壁上及河谷岩坡间。平时结群活动;我们见到的群集,有 3—5 只,十数只乃至几十只不等。有时和原鸽混群;这些原鸽通常以为是 *C. livia intermedia* Strickland,但因个别变异甚著,显然是家鸽变为野生化的。

落地捡食时,彼此靠得很近,甚至相互冲撞。食物纯为植物性,有青棵、草籽、野生豆科植物的种子、油菜籽、浆果等。李桂垣等(1985)在四川宝兴剖检 9 只鸽胃:6 月 1 鸟,其食物主要为豌豆(285 粒),还有少许四季豆和玉米;8 月 1 鸟,采自高山之巅,其食物全为珠芽蓼;11—12 月 7 鸟,除 1 鸟的食物为豌豆外,其余均为荞麦。

繁殖季节和其他鸽子一样咕咕地叫个不停,巢和卵等均未采到;估计是在它们栖息地的较高处筑巢在不易达到的岩棚、石隙、崖洞间。