

郑作新, 1976, 263—268; 郑作新等, 1983, 115—119; de Schauensee, 1984, 248—250.

12. 雪鸽 *Columba leuconota* Vigors

英文名 Snow Pigeon.

地理分布 甘肃西北部, 青海东部, 四川北部、西部及西南, 云南西北部, 西藏自昌都地区, 沿着喜马拉雅山脉向西, 越过国境, 直达阿富汗。

鉴别特征 头黑; 尾亦黑, 而于其中部具一宽阔的白色横斑; 下体纯白。

形态 (依据青海祁连所采的 *C. l. gradaria* 标本)

雌雄同色。头以及颈的上部均乌灰色; 后颈下部白色; 上背、两肩, 及内侧的小覆羽和次级飞羽等悉淡褐; 下背白; 腰和尾上覆羽黑; 尾羽灰黑, 中部横贯以宽阔白斑, 这个白色横斑向两侧尾羽逐渐后移, 至最外侧尾羽则几位于羽端; 这一对最外侧尾羽的基部外翮亦白。两翅大都灰色; 中覆羽、大覆羽及次级飞羽等的末端淡褐, 折合时形成翅斑; 初级飞羽暗灰, 末端淡褐。下体自前颈下部以次纯白。

虹膜金黄; 嘴黑; 脚及趾淡红, 爪黑。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(11)	310—360	307—360	16—21	230—260	149—151	27.2—33
♀♀(2)	249, 249	324—343	18.8—20.5	224—237	144—162	29—30

亚种分化 计有 2 个亚种; 它们在喜马拉雅山脉亚东地区相遇, 指名亚种在 3 000 米以下的山坡向东伸得更远些。

亚种检索

头呈暗灰而沾褐; 翕羽较褐……………指名亚种 *C. l. leuconota*
 头呈乌灰色; 翕羽较灰……………华西亚种 *C. l. gradaria*

(1) 指名亚种 *Columba l. leuconota* (Vigors)

分布于西藏自亚东以西的南部; 国外见于尼泊尔、印度、锡金以西地区、巴基斯坦及阿富汗东北部。

形态特征见上列的检索。据 Vaurie (1965), 由巴基斯坦所采的 20♂♂, 翅长为 235—248(240.5) 毫米, 而从四川、甘肃所采得的 17♂♂, 翅长为 241—260(248) 毫米。由此可见指名亚种的体形较小些。我们从这两个亚种翅长的量度, 也得相似的结果。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(3)	231—268	335—343	22.5—24	230—244	134—144	26.5—27
♀(1)	260	343	18.6	238	134	27

Columba leuconota Vigors, 1830—31, Proc. Comm. Zool. Soc. London, 1:23 (模式产地: 喜马拉雅山脉).