

雄性成鸟 前额和头顶前部淡灰,头顶余部以至后头为鸽灰而带葡萄酒的粉红色;后颈基处和其两侧有宽阔的黑色领圈,黑羽末端为白色或黄白色,成点斑状;上体余部为褐色,羽缘较淡;中央尾羽与背同色,但较深些;外侧尾羽黑色,末端为宽阔的白斑;翼缘及外侧小覆羽和中覆羽等均蓝灰色,其余覆羽较背部为淡;飞羽深褐,羽缘较淡;颏近白色;头侧、喉、胸及腹等均为葡萄酒的粉红色;两胁和腋及尾下覆羽均灰。

雌鸟体色与雄鸟相似,但不如后者辉亮。

虹膜褐色;嘴深角褐色;跗蹠及趾均紫红色,爪角褐色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(10)	182 (162—200)	约 322 (300—340)	17.1 (15.5—19)	159 (154—163)	160 (155—165)	24.1 (23—25)
♀♀(10)	170 (150—205)	约 313 (295—330)	16.5 (15.5—18)	156 (148—160)	147 (137—160)	22.8 (21—24)

亚种分化 本种计有 8 个亚种,其中产于我国者有 5 个。

亚种检索

1. 翅上覆羽具明显的黑色羽干纹 2
翅上覆羽无黑色羽干纹 3
2. 尾下覆羽灰色 西南亚种 *Streptopelia c. vacillans*
尾下覆羽白或淡黄 滇西亚种 *S. c. tigrina*
3. 体形较大,翅长 10♂♀ 156(150—163) 毫米 指名亚种 *S. c. chinensis*
体形较小,翅长 ♂♀ 145—155 毫米(据 台湾亚种 *S. c. formosa*
体形最小,翅长 ♂♂ 139—157, ♀♀ 137—149 毫米 海南亚种 *S. c. hainana*

(1) 指名亚种 *Streptopelia chinensis chinensis* (Scopoli)

分布于我国东部,并曾被引入夏威夷群岛。形态和量衡度均见于前文。

Columba chinensis Scopoli, 1786, Del. Flor. et Faun. Insubr., 2: 94 (模式产地: 广州)。

Streptopelia chinensis frigoris Stresemann, 1924, Abh. Ber. Mus. Tierk. Völkerk. Dresden, 16(2): 67 (模式产地: 山东青州)。

Streptopelia chinensis setzeri Deignan, 1955, Proc. Biol. Soc. Wash., 68: 145(模式产地: 四川宜宾)。

(2) 滇西亚种 *Streptopelia chinensis tigrina* (Temminck)

在国内,见于四川西南部,云南西北部以至南部。在国外,分布于孟加拉国,印度阿萨姆,缅甸,中南半岛,马来半岛及印度尼西亚苏门答腊,加里曼丹,并被引入苏拉威西岛及佛罗勒斯海中的诸小岛。

形态见前文。

量衡度(据昆明动物研究所鸟类组):

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	130, 190	300, 305	15, 17	148	151, 156	24, 24.5
♀♀(3)	130—156	310—320	15—16	144	147—158	24—25