

色的黑块斑;肩羽具显著色红褐色羽缘;尾端灰白;下体主为葡萄酒的红褐色。

形态(依据北京所采的指名亚种标本)

成鸟 雌雄相似。头和颈灰褐而带葡萄酒色,前额和头顶有更多的蓝灰色;在颈基两侧各有一块羽缘为蓝灰色的黑羽;上背褐色,各羽缘以红褐色;下背和腰均蓝灰;尾上覆羽褐而带灰,羽端纯灰;中央尾羽褐色,羽端沾灰;外侧尾羽褐色更深,而灰色端部更宽,最外侧尾羽的外翮为灰白色;肩羽和内侧飞羽均黑褐,羽缘红褐;外侧中覆羽和大覆羽深石板灰色,羽端较淡;飞羽黑褐而具较淡的狭缘。下体为葡萄酒的红褐色;颏和喉呈带黄的粉红色;腹部淡灰;两肋、腋羽及尾下覆羽均蓝灰色;尾下覆羽较淡。

虹膜橙色;嘴暗铅蓝色;跗蹠或多或少为洋红色,爪角褐色

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(10)	238 (175—323)	约 331 (310—350)	17.5 (16.2—19)	198 (190—203)	138 (133—145)	23.7 (20—26)
♀♀(10)	228 (192—280)	约 311 (290—320)	17.1 (16—18)	190 (180—203)	132 (125—140)	21.8 (19.5—23)

亚种分化 计有 5 个亚种,其中除 1 个亚种外,均见于我国。

亚 种 检 索

- 腹部葡萄红色最浓;尾下覆羽和尾羽端斑的鸪灰色较多蓝辉;体形较小,翅长 7♂♂ 181.6(170—191), 4♀♀ 174—180 毫米..... 云南亚种 *S. o. agricola*
- 腹部较多葡萄红色;尾下覆羽淡鸪灰色;尾羽端斑亦为此色;体形较大,翅长 10♂♂ 198(190—203), 10♀♀ 190(180—203) 毫米..... 指名亚种 *S. o. orientalis*
- 腹部较淡,下腹近白;尾下覆羽及尾羽端斑均纯白;翅长与指名亚种相似.....新疆亚种 *S. o. meena*
- 腹部较少葡萄色,较多灰色,因而比较暗钝;体形较指名亚种为小,翅长 4♂♂ 192(188—195), 8♀♀ 181(179—185) 毫米 (Vaurie); ♂♀ 163—178 毫米 (Hachisuka and Udagwa) 台湾亚种 *S. o. ori;*

(1) 新疆亚种 *Streptopelia orientalis meena* (Sykes)

分布在新疆北部、西部及中部,喜马拉雅山脉西部。在国外,见于西伯利亚西部,亚洲中部、伊朗、阿富汗、克什米尔,东抵尼泊尔西部。

形态: 胸和腹侧为葡萄红;下腹中央和尾下覆羽及尾羽端斑均纯白;颏、喉等的棕色均浅淡,而白色。

量衡度(据钱燕文等, 1965):

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(3)	193—276	282—310	16—17.3	193—200	125—132	25.5

Columba meena Syjes, 1832, proc. Comm. Zool. Soc. London, 2:149 (模式产地: 印度德干高原).

(2) 指名亚种 *Streptopelia orientalis orientalis* (Latham)

遍布于新疆亚种 (*S. o. meena*) 和云南亚种 (*S. o. agricola*) 以东的大陆。自东