

特产亚种。

颈部红色仅限于颈侧，上体黑褐色斑较指名亚种宽阔，头顶暗褐色，浅棕黄色纹狭细而明显。上体黑褐色有栗色横斑，头上有棕色羽干纹。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (4)	130—161	260—291	43—45	140—151	72—80	26—28
♀♀ (3)	132—163	260—288	42—45	141—152	72—82	25—28

Lepocestes sinensis Rickett, 1897, Bull. Brit. Orn. Cl., 6: 1 (福建挂墩).

Blythipicus pyrrhotis sinensis Peters, 1948, 6: 224—225; 郑作新, 1976, 379.

(3) 海南亚种 *Blythipicus pyrrhotis hainanus* (Ogilvie-Grant)

只分布于海南 (留鸟)。此是中国特产亚种。

形态和量衡度见种的描述。

Lepocestes hainanus Ogilvie-Grant, 1899, Ibis, (7) 5: 585 (海南五指山).

Blythipicus pyrrhotis hainanus Peters, 1948, 6: 225; 郑作新, 1976, 379—380.

生态 栖于阔叶乔木林中，常单个或成对活动，叫声频繁而嘈杂，易与其他啄木鸟区别。食物为蠕虫，在云南西部剖验两个鸟胃，全为蠕虫，其中一胃的蠕虫多达 27 条。

巢营于离地面较高的树洞中。每窝产卵 5—7 枚，6 枚最普遍。卵呈淡红色。

经济意义 此鸟数量稀少，而且食虫，对人类有益，应加以保护。从生物多样性角度出发，同样亦应加以保护。

[*Psicus*] *Pyrrhotis* Hodgson, 1837, Journ. As. Soc. Bengal, 6: 108 (尼泊尔).

L. 大金背啄木鸟属 *Chrysocolaptes* Blyth, 1843

形态 嘴长而直，鼻孔长且扩张。脚格外强壮，大趾发达，爪长而强。外侧尾羽较尾上覆羽略长。

地理分布 国内只见于云南。国外分布于印度，斯里兰卡及东南亚各国。

参阅: Baker, 1927, 4: 78—82 ; Peters, 1948, 6: 225—228; Clements, 1974, 209; 郑作新, 1976, 380; Howard and Moore, 1980, 267; Short, 1982, 498—507; de Schuensee, 1984, 303.

29. 大金背啄木鸟 *Chrysocolaptes lucidus* (Scopoli), 1796

英文名: Large Golden-backed Woodpecker, Crimson-backed Woodpecker, Greater Flame-backed Woodpecker.