

柬埔寨等地。

鉴别特征 体较大，嘴黄色，嘴端呈截平状。体羽大都栗色，上下体均有横斑。

形态 (根据海南亚种，标本采自海南岛。)

上体大都棕褐色，下背以下暗褐色；自枕下至颈侧及耳羽后有一大赤红斑；头顶羽具淡色轴纹；背、尾及翅具黑横斑。下体暗褐色，胸具淡栗色细羽干纹。雌鸟颈项及颈侧均无红斑。幼鸟头上羽干纹较粗，下体较暗褐色。

虹膜棕红 (♂) 和灰褐色 (♀)；嘴黄，基部沾绿色；跗蹠和趾淡褐黑色，爪角绿色。

✓ **量衡度** (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	117	254	41.2	135	80	26.2
♀(4)	118.5	252.2	40.9	137.5	80.7	25.2
	(110—134)	(242—269)	(39.5—41.6)	(135—140)	(75—90)	(25—25.8)

亚种分化 黄嘴栗啄木鸟分化为 5 个亚种，我国有 3 个。

✓ **亚种检索表**

1. 头顶黑褐色，而具棕色羽干纹；背面黑褐色，而杂以红棕色横斑…… 云南亚种 *B. p. annamensis*
- 头顶暗棕褐色，而具黄棕色羽干纹；背面暗棕褐色，上背杂以黄棕色横斑 …………… 2
2. 下背和腰等似上背，亦均杂以黄棕色横斑，但较细而密；雄鸟后颈两侧各具一赤红色点斑 ……………
- …………… 华南亚种 *B. p. sinensis*
- 下背和腰乌褐色，羽端微棕色，不呈横斑状；雄鸟后颈两侧的赤红色点斑向中央扩展，但仍不相连 …………… 海南亚种 *B. p. hainanus*

(1) 云南亚种 *Blythipicus pyrrhotis annamensis* Kinnear

云南南半部 (留鸟)。国外分布于尼泊尔，孟加拉，印度阿萨姆，缅甸，泰国北部，老挝，越南北部等地。

头顶黑褐色具棕色羽干纹；背部黑褐色而有红棕色横斑。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	130—160	262—290	41—47	145—150	75—85	75—85
♀♀(3)	135—162	262—293	44—46	145—152	72—85	78—85

Blythipicus pyrrhotis annamensis Kinnear, 1926, Bull. Brit. Orn. Cl., 46: 72 (越南: Langbian Peaks).

(2) 华南亚种 *Blythipicus pyrrhotis sinensis* (Rickett)

只分布于四川西部康定，贵州绥阳，广西，湖南，广东，福建 (留鸟)。此是中国

特产亚种。

颈部红色仅限于颈侧，上体黑褐色斑较指名亚种宽阔，头顶暗褐色，浅棕黄色纹狭细而明显。上体黑褐色有栗色横斑，头上有棕色羽干纹。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(4)	130—161	260—291	43—45	140—151	72—80	26—28
♀♀(3)	132—163	260—288	42—45	141—152	72—82	25—28

Lepocestes sinensis Rickett, 1897, Bull. Brit. Orn. Cl., 6: 1 (福建挂墩).

Blythipicus pyrrhotis sinensis Peters, 1948, 6: 224—225; 郑作新, 1976, 379.

(3) 海南亚种 *Blythipicus pyrrhotis hainanus* (Ogilvie-Grant)

只分布于海南 (留鸟)。此是中国特产亚种。

形态和量衡度见种的描述。

Lepocestes hainanus Ogilvie-Grant, 1899, Ibis, (7) 5: 585 (海南五指山).

Blythipicus pyrrhotis hainanus Peters, 1948, 6: 225; 郑作新, 1976, 379—380.

生态 栖于阔叶乔木林中，常单个或成对活动，叫声频繁而嘈杂，易与其他啄木鸟区别。食物为蠕虫，在云南西部剖验两个鸟胃，全为蠕虫，其中一胃的蠕虫多达 27 条。

巢营于离地面较高的树洞中。每窝产卵 5—7 枚，6 枚最普遍。卵呈淡红色。

经济意义 此鸟数量稀少，而且食虫，对人类有益，应加以保护。从生物多样性角度出发，同样亦应加以保护。

[*Psicus*] *Pyrrhotis* Hodgson, 1837, Journ. As. Soc. Bengal, 6: 108 (尼泊尔).

L. 大金背啄木鸟属 *Chrysocolaptes* Blyth, 1843

形态 嘴长而直，鼻孔长且扩张。脚格外强壮，大趾发达，爪长而强。外侧尾羽较尾上覆羽略长。

地理分布 国内只见于云南。国外分布于印度，斯里兰卡及东南亚各国。

参阅: Baker, 1927, 4: 78—82 ; Peters, 1948, 6: 225—228; Clements, 1974, 209; 郑作新, 1976, 380; Howard and Moore, 1980, 267; Short, 1982, 498—507; de Schuensee, 1984, 303.

29. 大金背啄木鸟 *Chrysocolaptes lucidus* (Scopoli), 1796

英文名: Large Golden-backed Woodpecker, Crimson-backed Woodpecker, Greater Flame-backed Woodpecker.