

雌性成鸟 与雄鸟相似，但头上无粉红色，而是全为淡金黄色；下体的乌黑色稍淡；其余与雄鸟完全相同。

虹膜棕红；嘴基铅蓝色，先端淡角黄色；脚铅绿色，爪淡绿黄色。

✓量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(6)	79.5 (75—86)	256 (242—271)	25.6 (25.2—26.4)	128.5 (126—130)	87.6 (84—95)	22.3 (21.5—23)
♀♀(3)	84.2 (82.5—86)	252.6 (245—260)	24.4 (24—24.7)	127.3 (125—130)	83.6 (77—90)	22.3 (22—23)

亚种分化 竹啄木鸟分化为3个亚种。

✓ 亚种检索表

- 下体大都呈淡橄榄褐色 云南亚种 *G. g. indochinensis*
- 下体大都呈浓橄榄绿色 东南亚种 *G. g. viridanus*
- 下体大都暗橄榄褐色 指名亚种 *G. g. grantia*

(1) 指名亚种 *Gecinulus grantia grantia* (McClelland)

国内分布于云南西部盈江。国外分布于尼泊尔，锡金，印度阿萨姆，孟加拉，缅甸。

头顶及颈部玫瑰红色而沾橙色；背部暗红色；下体橄榄褐色；尾深红而具棕红色近端斑。

量衡度（据 Baker, 1927; mm, g）：性别（♂♀），全长约 250—260，嘴峰 24—27，翅 128—134，尾 79—86，跗蹠 23—24。

Picus (Chrysonotus) grantia McClelland, 1840 (1839), Proc. Zool. Soc. London, 165 (印度阿萨姆).

Gecinulus grantia grantia Peters, 1948, 6: 147.

(2) 云南亚种 *Gecinulus grantia indochinensis* Delacour

分布于云南西部、西南部耿马、南部西双版纳、东南部河口（留鸟）。国外见于越南和老挝。

Gecinulus grantia indochinensis Delacour, 1927, Bull. Brit. Orn. Cl., 47: 154 (越南北部: Backan); Peters, 1948, 6: 147; 郑作新, 1976, 363—364.

形态和量衡度见种的描述。