

亚种分化 本种有 8 亚种，我国有 3 亚种。

✓ 亚种检索表

- 体形较大，翼长达 120 mm 以上；腰部翠蓝色 东北亚种 *H. c. major*
 体形较小，翼长不及 120 mm；腰部中央淡皮黄色 指名亚种 *H. c. coromanda*
 腰部中央淡蓝色 台湾亚种 *H. c. bangsi*

(1) 指名亚种 *Halcyon coromanda coromanda* (Latham)

云南南部西双版纳和东南部河口（留鸟）。国外分布于尼泊尔，印度阿萨姆，孟加拉，缅甸，泰国到马来西亚及中南半岛三国。

额、头顶、颈、背、两翼、尾羽、头侧和颈侧均棕栗红色，并闪耀紫蓝色光泽；腰部中央及中央尾上覆羽的羽基淡皮黄色，羽端白而染亮钴蓝色，亦闪紫光；整个下体棕黄色，胸部颜色较深，颏、喉下腹稍浅淡（杨岚等，1995，云南鸟类志，上卷）。

Alcedo coromanda Latham, 1790, Ind. Orn., 1: 252 (印度: Coromandel).

✓ *Halcyon coromanda coromanda* Peters, 1955, 5: 194; 郑作新, 1976, 337.

(2) 东北亚种 *Halcyon coromanda major* Temminck et Schlegel

黑龙江的牡丹江和松花江，吉林东部长白山地区（旅鸟，繁殖鸟）；河南信阳、江苏沙卫山、福建福州、台湾（旅鸟）、广东（偶见）。国外见于朝鲜，日本及印度尼西亚的苏拉威岛。

形态和量衡度见种的描述。

✓ *Halcyon coromanda major* Temminck et Schlegel, 1848, in Siebold, Faun. Jap., Aves, 75, 图版 39 (日本); Peters, 1955, 5: 194; 郑作新, 1976, 337—338.

(3) 台湾亚种 *Halcyon coromanda bangsi* (Oberholser)

台湾和兰屿（留鸟）。国外见于琉球群岛，菲律宾北部和西部。

全长 270 mm。嘴粗厚，红色；脚红色。背面大致为红褐色而有紫色光泽，腰部中央淡蓝色。喉淡橙褐色，胸以下橙褐色，下腹至尾下覆羽羽色较淡（王嘉雄等，1991，台湾野鸟图鉴）。

Entomothera coromanda bangsi Oberholser, 1915, Proc. U. S. Nat. Mus., 48: 652 (琉球群岛: Yaeyama, Ishigaki Is.).

✓ *Halcyon coromanda bangsi* Peters, 1955, 5: 195; 郑作新, 1976, 338.

生态 主要生活在林间溪流附近。繁殖季节主要生活在原始针阔叶混交林或阔叶林的山溪水边。常到远离水的密林中活动。喜欢单独生活。有时边飞边叫，鸣声清脆洪