

Harpactes erythrocephalus helenae Mayr, 1941, Ibis (14), 5: 495 (模式产地: 缅甸 Nyetmawhka, Myitkyina District).

✓ Smythies, 1953, 358; Peters, 1955, 5: 163; Ali et Ripley, 1970, 4: 65—66; 郑作新, 1976, 331; 昆明动物研究所, 1980, 2: 72; de Schauensee, 1984, 282.

Harpactes erythrocephalus yamakanensis, 李桂垣等, 1985, 3: 144 (部分).

(2) 指名亚种 *Harpactes erythrocephalus erythrocephalus* (Gould)

分布于云南西南隅的耿马、沧源一带 (留鸟)。国外分布于孟加拉国、印度阿萨姆东南部、缅甸南部及泰国西北部。

体形比华南亚种小, 比海南亚种大, 翅长 (♂♀) 在 143—150 之间; 雄鸟头、胸部红色鲜艳; 背部呈橄榄棕色; 翅上覆羽白色虫蠹状纹较密集。

✓ 量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(3)	89—108	310—340	18—19	147—150	190—198	14—14.5
♀(1)	89	300	18	144	172	15
♂♂(7) (据 Ali et Ripley)			21—22	143—148	177—201	

(自颅骨起)

Trogon erythrocephalus Gould, 1834, Proc. Zool. Soc. London, 2: 25 (模式产地: 缅甸仰光).

Pyrotrogon erythrocephalus erythrocephalus Baker, 1927, 4: 318—319 (部分).

✓ *Harpactes erythrocephalus erythrocephalus* Smythies, 1953, 359—360; Peters, 1955, 5: 163; Ali et Ripley, 1970, 4: 66; 郑作新, 1976, 331; de Schauensee, 1984, 282.

(3) 滇东亚种 *Harpactes erythrocephalus intermedius* (Kinnear)

分布于四川雷波、马边一带, 云南西双版纳至东南部勐喇, 贵州荔波、茂兰, 广西南缘龙州、宁明至天等县一带 (留鸟)。国外分布于老挝北部至越南北部。

体形大小与指名亚种相似; 但头、胸部红色较暗; 背部橄榄褐色的棕色成分较不显; 翅上覆羽的白色虫蠹状纹略较细, 其间的黑纹则显得较宽。

✓ 量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(16)	90.3 (90—100)	340.5 (322—376)	19.8 (19—21)	145.4 (142—150)	190.7 (182—207)	14.4 (13—16)
♀♀(12)	90.8 (87—101)	319.6 (305—340)	19.5 (19—20)	146.1 (144—150)	188 (180—200)	14.5 (13—16)