

扩散。

Bucco oorti Muller, 1835, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2: 341 (印度尼西亚: 苏门答腊).

6. 蓝喉拟啄木鸟 *Megalaima asiatica* (Latham), 1790

英文名: Blue-breasted Barbet, Blue-throated Barbet。

地理分布 见于我国的云南和广西。国外则分布于印度, 缅甸, 泰国, 越南, 老挝, 加里曼丹等地。

鉴别特征 通体概绿, 头顶有两块朱红色斑, 喉部浅蓝色, 明显易见; 翼和尾均短, 飞行迟钝。

形态 (依据云南亚种描述, 标本采自云南勐腊。)

成鸟 额、枕、后颈前半段血红色, 头顶深蓝色, 眼下和耳羽天蓝色, 耳羽上有一粗大的黑色纵纹; 后颈后半段、翕、背、腰、尾上覆羽、尾羽深绿色; 飞羽黑色, 从初级飞羽第3片起, 每片飞羽的外羽片均有不同程度深绿色, 越往里越多; 初级飞羽外羽片端部有灰黄白色羽缘; 次级飞羽内羽片具宽阔的灰黄白色羽缘。下体的颏、喉、前颈前半部的中央天蓝色, 在前颈前半部中央的两侧, 各有一血红色的斑; 前颈后半部、胸、腹、尾下覆羽、两胁浅绿色。

虹膜红褐色; 眼周裸出部橙色; 嘴角褐色, 先端近黑色, 基部角黄色; 脚灰绿色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♂ (10)	86.7 (80—92)	229.2 (196—240)	25.6 (24.1—26.9)	100.0 (98—103)	60.7 (58—63)	25.5 (24.1—26.8)
♀ ♀ (7)	86.8 (78—97)	224 (210—242)	25.8 (24.8—28)	99.1 (98—101)	60.3 (58—62)	25.3 (24—26.4)

亚种分化 蓝喉拟啄木鸟分化为5个亚种, 分布于我国有2个。

亚种检索表

- 头顶横带较窄, 呈黑色, 有时沾蓝 指名亚种 *M. a. asiatica*
头顶横带较宽, 全为蓝色 云南亚种 *M. a. davisoni*

(1) 指名亚种 *Megalaima asiatica asiatica* (Latham)

终年留居于云南西部盈江和腾冲、西南部西盟和澜沧、中部及南部西双版纳(澜沧江以西部分)。国外见于克什米尔, 印度北部向东至印度阿萨姆, 南至缅甸。

头顶横带较窄, 呈黑色, 有时沾蓝。

量衡度 (据 Baker, 1927; mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♀			23—27	100—110	62—69	25—26

Trogon asiaticus Latham, 1790, Ind. Orn., 1: 201 (印度: Calcutta).

Megalaima asiatica asiatica Peters, 1948, 6: 36; 郑作新, 1976, 353.

(2) 云南亚种 *Megalaima asiatica davisoni* Hume

分布于云南东部中部景东、南部西双版纳 (澜沧江以东部分)、东南部河口和富宁, 广西。国外见于缅甸东部和南部, 泰国, 老挝, 越南北部。

形态和量衡度见种的描述。

Megalaima davisoni Hume, 1877, Str. Feath., 5: 108 (缅甸: Meetan, Tenasserim).

Megalaima asiatica davisoni Peters, 1948, 6: 37; 郑作新, 1976, 353.

生态 蓝喉拟啄木鸟为树栖鸟, 生活在海拔千余米以下的山谷、丘陵、平原等地的次生阔叶林或村落旁森林带, 不见于阴暗稠密的原始森林内。

性不甚畏人, 常静栖叶丛中, 因其体羽几纯绿, 故极难觅见。翼、尾均短, 飞行迟钝。大多在树间飞动, 少作长距离飞行。

每在拂晓太阳初升后, 它们便忙碌地飞到果树上觅食。多单独活动, 即使在繁殖幼鸟出窝后, 成鸟与幼鸟的群集亦持续不久, 而成散居状态。有时亦见到它们相聚, 群集于1—2棵果树上, 这不过是为了寻食之故。在冬旱季节, 成熟的果树不多, 就有许多种食果鸟混在一起觅食。如1959年1月2日, 动物研究所的科考人员于云南西双版纳的勐混, 见到它与蓝耳拟啄木鸟、鵙科的黑冠黄鵙、栗耳短脚鵙、黑鵙等混聚在一棵榕树上吃果。也曾于1958年11月16日中午, 于云南西双版纳的勐腊地区, 见到它与赤胸拟啄木鸟, 山椒鸟科的赤红山椒鸟, 和平鸟科的大绿雀鵙、橙腹叶鵙, 卷尾科的古铜色卷尾、小盘尾, 太阳鸟科的蓝枕花蜜鸟、黑胸太阳鸟, 莺亚科的柳莺属小鸟, 甚至还有鹰科的蛇雕等十多种大大小小不同的鸟在一棵盛开鲜花的树上活动。

此种鸟饱食之后便隐匿在乔木或亚乔木的密叶丛中鸣叫, 鸣声清脆而响亮, 声似“bu-ga-r, bu-ga-r---”, 历久不息。有时能静栖在枝叶中, 独鸣达数分钟或更长时间。它们常重复最后一音, 不过软弱无力, 有如“ga-r-r-r-r-r-”, 酷似鸺鹠深夜的长啸声。冬季, 它们显得寂静, 不爱鸣叫, 但在云南南部海拔较低的勐腊和允景洪等地, 冬季仍常听到它们的歌声。

食物以野果为主, 分析在西双版纳所采到的鸟胃, 绝大部分为榕果 (*Ficus* sp.), 一胃含翅麻栗果。有人说它们也吃蛆和柔软昆虫, 并剖一胃内有一条蜈蚣。分析在云南西部的5只鸟胃, 其内含物也全为榕树果。