

量衡度 (据 Baker, 1927; mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♀			23—27	100—110	62—69	25—26

*Trogon asiaticus* Latham, 1790, Ind. Orn., 1: 201 (印度: Calcutta).

*Megalaima asiatica asiatica* Peters, 1948, 6: 36; 郑作新, 1976, 353.

## (2) 云南亚种 *Megalaima asiatica davisoni* Hume

分布于云南东部中部景东、南部西双版纳 (澜沧江以东部分)、东南部河口和富宁, 广西。国外见于缅甸东部和南部, 泰国, 老挝, 越南北部。

形态和量衡度见种的描述。

*Megalaima davisoni* Hume, 1877, Str. Feath., 5: 108 (缅甸: Meetan, Tenasserim).

*Megalaima asiatica davisoni* Peters, 1948, 6: 37; 郑作新, 1976, 353.

**生态** 蓝喉拟啄木鸟为树栖鸟, 生活在海拔千余米以下的山谷、丘陵、平原等地的次生阔叶林或村落旁森林带, 不见于阴暗稠密的原始森林内。

性不甚畏人, 常静栖叶丛中, 因其体羽几纯绿, 故极难觅见。翼、尾均短, 飞行迟钝。大多在树间飞动, 少作长距离飞行。

每在拂晓太阳初升后, 它们便忙碌地飞到果树上觅食。多单独活动, 即使在繁殖幼鸟出窝后, 成鸟与幼鸟的群集亦持续不久, 而成散居状态。有时亦见到它们相聚, 群集于 1—2 棵果树上, 这不过是为了寻食之故。在冬旱季节, 成熟的果树不多, 就有许多种食果鸟混在一起觅食。如 1959 年 1 月 2 日, 动物研究所的科考人员于云南西双版纳的勐混, 见到它与蓝耳拟啄木鸟、鹎科的黑冠黄鹎、栗耳短脚鹎、黑鹎等混聚在一棵榕树上吃果。也曾于 1958 年 11 月 16 日中午, 于云南西双版纳的勐腊地区, 见到它与赤胸拟啄木鸟, 山椒鸟科的赤红山椒鸟, 和平鸟科的大绿雀鹎、橙腹叶鹎, 卷尾科的古铜色卷尾、小盘尾, 太阳鸟科的蓝枕花蜜鸟、黑胸太阳鸟, 莺亚科的柳莺属小鸟, 甚至还有鹰科的蛇雕等十多种大大小小不同的鸟在一棵盛开鲜花的树上活动。

此种鸟饱食之后便隐匿在乔木或亚乔木的密叶丛中鸣叫, 鸣声清脆而响亮, 声似 “bu-ga-r, bu-ga-r- - -”, 历久不息。有时能静栖在枝叶中, 独鸣达数十分钟或更长时间。它们常重复最后一音, 不过软弱无力, 有如 “ga-r-r-r-r-r-”, 酷似鸫鹛深夜的长啸声。冬季, 它们显得寂静, 不爱鸣叫, 但在云南南部海拔较低的勐腊和允景洪等地, 冬季仍常听到它们的歌声。

食物以野果为主, 分析在西双版纳所采到的鸟胃, 绝大部分为榕果 (*Ficus* sp.), 一胃含翅麻栗果。有人说它们也吃蛆和柔软昆虫, 并剖一胃内有一条蜈蚣。分析在云南西部的 5 只鸟胃, 其内含物也全为榕树果。