

(1) 云南亚种 *Megalaima australis cyanotis* (Blyth)

见于云南西南部和南部思茅和西双版纳。国外分布于锡金，印度阿萨姆，缅甸，泰国，越南，老挝，柬埔寨。

形态和量衡度见种的描述。

Bucco cyanotis Blyth, 1847, Journ. As. Soc. Bengal, 16 (1): 465 (缅甸: Arakan).

Megalaima australis cyanotis Peters, 1948, 6: 38; 郑作新, 1976, 353.

生态 栖于田坝或村寨周围的高大榕树等平原常绿林中。常隐匿于高树顶的密叶丛中鸣叫。鸣声清脆响亮，声似“tu-rook, tu-rook, ---”，久鸣不停。鸣叫时，与鸚鵡似鼓的叫声在山谷间互相呼应，犹如打锣击鼓一般。因其体羽全为绿色，故极难觅见，平时仅闻其声而不见其鸟。在云南南部剖验6个鸟胃，食物全为无花果。3月中旬开始凿洞，准备繁殖。

经济意义 此鸟羽色艳丽，可供观赏；它们好吃浆果，对植物扩散有益。

Bucco australis Horsfield, 1821, Trans. Linn. Soc. London, 13: 181 (印度尼西亚: 爪哇)。

8. 赤胸拟啄木鸟 *Megalaima haemacephala* (Muller), 1776

英文名: Crimson-breasted Barbet。

地理分布 我国仅见于云南西部至南部西双版纳。在国外，留居于印度，尼泊尔，锡金，泰国，中南半岛，斯里兰卡，印度尼西亚，菲律宾等地。

鉴别特征 额、头顶、前颈后半部血红色，枕和后颈黑色，眼下、颊、喉鲜黄色，上体为深绿色；其余下体为淡黄绿色，每条羽毛具粗大的深绿色纵纹。

形态 (依据云南亚种描述，标本采自云南元江和勐腊。)

成鸟 额、头顶血红色，枕黑色；眼先黑色，眼的上、下为鲜黄色，眼上为粗大的纹，眼下为长块状；块状下为粗大的黑色纹；后颈、翕、背、腰、尾上覆羽、尾羽深绿色；飞羽黑色，从初级飞羽第2片起，每片羽毛的外羽片均有不同程度的深绿色，越往里范围越大，越往外范围越窄。下体的颊、喉鲜黄色；前颈的前半段黑色，后半段血红色；胸、腹、尾下覆羽、两胁淡黄绿色，每片羽毛的中央具非常粗大的深绿色纵纹，其粗大程度占羽毛一半或稍多。

虹膜暗褐色；眼周裸露的皮肤为朱红色；嘴黑色；跗蹠和趾棕红，爪角褐色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (10)	41.9	161.7	18.6	83.5	33.4	19.6