

版 527 (越南南部).

4. 金喉拟啄木鸟 *Megalaima franklinii* (Blyth), 1842

英文名: Golden-throated Barbet。

地理分布 留居于我国西藏东南部、云南及广西西南部。国外分布于尼泊尔、锡金、缅甸、泰国、越南、老挝、马来半岛等地的高山地带。

鉴别特征 额和后颈中部鲜红色, 头顶金黄色, 头的两侧具粗大的黑色过眼纹; 上体余部深绿色。下体的颏、喉蛋黄色, 前颈白色, 其余下体浅绿色。

形态 (依据指名亚种, 标本采自云南潞西。)

成鸟 额和后颈中部鲜红色, 头顶金黄色, 头的两侧具粗大的黑色过眼纹, 从嘴峰至后颈止, 耳羽白色或灰白色。背、腰、尾上覆羽、尾羽深绿色; 飞羽黑色, 除前 2 片飞羽外, 最初几片初级飞羽外羽片基段深蓝色, 后几片初级飞羽和次级飞羽的外羽片则为鲜绿色。下体的颏、喉蛋黄色, 两边嘴角红橙色, 前颈及其两侧白色, 胸、腹、尾下覆羽、体的两侧浅绿色。

虹膜褐色; 嘴淡蓝黑色; 跗蹠及爪灰绿色。

✓ 量衡度 (mm, g)

| 性别 | 体重 | 全长 | 嘴峰 | 翅 | 尾 | 跗蹠 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| ♂ ♂ (6) | 81.8 (80—89) | 216.8 (210—228) | 23.2 (22.2—23.9) | 98 (97—99) | 58 (54—60) | 22.8 (22—23.7) |
| ♀ ♀ (6) | 84.6 (83—90) | 208.8 (198—220) | 22.1 (21—24.7) | 96.5 (95—99) | 61 (57—66) | 22.8 (22.2—24.1) |

亚种分化 金喉拟啄木鸟有 5 个亚种, 见于我国的仅指名亚种。

(1) 指名亚种 *Megalaima franklinii franklinii* (Blyth)

终年留居在西藏东南部墨脱, 云南西北部贡山、西部盈江和腾冲、南部西双版纳和屏边及东南部马关等, 广西南部。国外见于尼泊尔, 锡金, 缅甸北部, 越南和老挝的北部等。

形态和量衡度见种的描述。

Bucco Franklinii Blyth, 1842, Journ. As. Soc. Bengal, 11: 167 (印度: Darjeeling).

Megalaima franklinii franklinii Peters, 1948, 6: 35; 郑作新, 1976, 351—352.

生态 生活于阔叶林间, 常单个或成对活动, 多停息在枝叶茂密的乔木林或亚乔木上。多在晨、昏鸣叫, 通常由一只开始, 而后引起同伴的鸣叫。叫声宏亮, 似“go—o—go”的音韵。在云南西部剖验 7 只鸟胃, 计有甲壳昆虫 (5 次)、野樱桃果 (7 次)、