

	(39—48)	(152—170)	(16.4—20.3)	(81—87)	(31—38)	(17.1—21.5)
♀♀(4)	42.9	155.3	18.5	79.5	30.3	19.1
	(39—46)	(149—160)	(17.4—19)	(78—82)	(29—33)	(18.6—19.5)

**亚种分化** 赤胸拟啄木鸟有 4 个亚种，而分布于我国的仅 1 个亚种。

### (1) 云南亚种 *Megalaima haemacephala indica* (latham)

分布于云南西部盈江和潞西、西南部永德和耿马及南部思茅和西双版纳。在国外见于印度西北部和阿萨姆，尼泊尔，锡金，越南，老挝，柬埔寨，整个中南半岛，马来西亚北部，斯里兰卡等地。

形态和量衡度见种的描述。

*Bucco indicus* Latham, 1790, Ind. Orn., 1: 205 (印度: Calcutta).

*Megalaima haemacephala indica* Peters, 1948, 6: 39; 郑作新, 1976, 353.

**生态** 常单个或成对栖于田坝或村寨周围的高大榕树上，与蓝喉拟啄木鸟一起觅食。鸣声单调，节拍均匀，似“多、多、多——”。在云南西部剖验 4 只鸟胃，胃内食物全为榕树果。

**经济意义** 此鸟羽色艳丽，可供观赏。它好食浆果，有益于植物扩散。

*Bucco haemacephalus* Muller, 1776, Natursyst., Suppl.: 88 (菲律宾).

## (二) 响蜜鸫科 Indicatoridae

共有 4 属 14 种。中国只有 1 属 1 种。

### A. 响蜜鸫属 *Indicator* Vieillot, 1816

**形态** 嘴粗短，嘴峰较曲；尾羽 12 片，羽干柔软；翅长而尖；初级飞羽 9 片，第 1 片几达翼端，第 2、3 片最长；跗蹠被羽。头骨上颞结构属雀腭型。

**地理分布** 大多数分布于非洲，只有两种分布于亚洲喜马拉雅山脉附近及我国云南，印度尼西亚及马来半岛。

参阅 Baker, 1927, 4: 131—132; Walter, 1980, 124—125; 杨岚等, 1995, 16 (4): 384.

#### 1. 黄腰响蜜鸫 *Indicator xanthonotus* Blyth, 1842

英文名: Yellow-backed Honeyguide.

**鉴别特征** 体形小似麻雀；嘴粗短而嘴峰曲；跗蹠被羽；上体大都灰褐色，下背至