

胁也是黑灰色，胸部较黑，腹和两胁较灰。

雌性成鸟 和雄鸟相似，但眼下无大红斑，该部位与头的其他颜色相同；颈、喉的黄色稍淡，其余的完全相同。

虹膜红褐色；嘴灰白色，嘴基和嘴端转黑；脚黑褐色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	443	457	63.7	242	166	36.6

亚种分化 大灰啄木鸟分化为2个亚种，而在我国内只有1个亚种。

(1) 云南亚种 *Mulleripicus pulverulentus harterti* Hesse

国内分布云南西南部沧源，南部西双版纳（留鸟）。国外分布于印度，缅甸，泰国及中南半岛三国。

形态和量衡度见种的描述。

Mulleripicus pulverulentus harterti Hesse, 1911, Osrn. Monatsb., 19: 182 (缅甸: Chindwin Riv. 上游的 Pya); Peters, 1948, 6: 149; 郑作新, 1976, 364.

生态 栖息于海拔1200 m以下的热带雨林，不见于高山。结零散小群活动，有时互相追逐，从一高树的巅处飞抵另一高树上，且飞且鸣。鸣声急促，略似“Woik”。主食蚁类，包括蚂蚁和白蚁。

经济意义 此鸟嗜食蚁类，尤其是白蚁，故对人类有益，应加予保护。从生物多样性出发，也应给以保护。

Picus pulverulentus Temminck, 1826, in Temminck et Laugier, Pl. col. Ois., 66: Pl. 389 (印度尼西亚: 爪哇及苏门答腊).

I. 黑啄木鸟属 *Dryocopus* Boie, 1826

形态 体形较大，雌雄全身几纯黑色，如有它色也是黑白分明。雌雄鸟的头顶均有红色。嘴楔状；鼻孔被羽；4趾。第1片初级飞羽很小，不及第2片的1/2。

地理分布 国内分布于新疆及从东北的大小兴安岭向西南经黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川至西藏东部和云南南部。国外见于俄罗斯的西伯利亚，蒙古；广泛分布于东南亚；从加拿大南部经美国，墨西哥，中美洲到阿根廷。

✓黑啄木鸟属分种检索表

- | | |
|----------|---------------------------|
| 腹白 | 白腹黑啄木鸟 <i>D. javensis</i> |
| 腹黑 | 黑啄木鸟 <i>D. martius</i> |