

尾黑色，最外侧 2 对尾羽为黑白横斑相间状；翅黑色而有楔形白斑，内侧飞羽有白端斑。喉白。下体白色，体侧缀黑条纹。雌鸟仅是头顶白色有黑轴纹。

虹膜暗红褐色；嘴角灰色；跗蹠和趾黑褐色，爪黑色。

✓ 量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♂(9)	65.8 (56—70)	221.3 (195—235)	31.9 (30—33)	122.9 (115—126)	86.9 (80—90)	20.6 (20—21.5)
♀ ♀(7)	61.0 (56—65)	222.3 (203—231)	29.4 (28.7—30)	121.0 (117—125)	84.3 (75—90)	20.8 (20—22)

亚种分化 三趾啄木鸟分化为 11 个亚种，而在我国有 3 个。

✓ 亚种检索表

1. 下体几乎纯黑色，仅微具白点 西南亚种 *P. t. funebris*
下体白色，杂以黑色斑纹 2
2. 下体黑色斑纹较多；上体较暗，白斑较少 天山亚种 *P. t. tianschanicus*
下体黑色斑纹较少；上体较淡，白斑较多 指名亚种 *P. t. tridactylus*

(1) 指名亚种 *Picoides tridactylus tridactylus* (Linnaeus)

国内见于内蒙古东北部呼伦贝尔盟，黑龙江小兴安岭，吉林长白山（留鸟）。国外分布于斯堪的纳维亚半岛，俄罗斯北部、西伯利亚南部山脉以及黑龙江与乌苏里江流域的俄罗斯部分，朝鲜东北部。

形态和量衡度见种的描述。

Picus tridactylus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 114 (瑞典).

Picoides tridactylus tridactylus Peters, 1948, 6: 215—216; 郑作新, 1976, 378.

(2) 天山亚种 *Picoides tridactylus tianschanicus* Buturlin

新疆西部喀什、天山及北部（留鸟）。此亚种是中国特产。

与指名亚种相同是下体白色非黑色，但上体较之暗色，且少白斑；下体黑色斑纹却较多。翅长 1♀ 123 mm (钱燕文等, 1965)。

Picoides tianschanicus Buturlin, 1907, Orn. Monatsab., 15: 9 (天山山脉).

Picoides tridactylus tianschanicus Peters, 1948, 6: 216; 郑作新, 1976, 378.

(3) 西南亚种 *Picoides tridactylus funebris* Verreaux

分布于青海东北部祁连至南部昂久，甘肃河西走廊东部祁连山区、宕昌、文县，西