

头顶较淡沾绿色 指名亚种 *P. i. innominatus*
 头顶纯淡栗色；胸以下近白色 华南亚种 *P. i. chinensis*

(1) 指名亚种 *Picumnus innominatus innominatus* Burton

国内仅见于西藏东部墨脱。国外见于尼泊尔、锡金到印度东部阿萨姆。

上体为鲜橄榄黄或光亮的金黄色；下体黄色也较云南亚种为深，而黑斑却较之浅淡。上体辉亮，渲染橙色。

Picumnus innominatus Burton, 1836 (1835), Proc. Zool. Soc. London, 154 (锡金).

Picumnus innominatus innominatus Peters, 1948, 6: 97.

(2) 云南亚种 *Picumnus innominatus malayorum* Hartert

终年留居云南西部盈江和潞西、西南部耿马和沧源、南部思茅和西双版纳以及东南部。在国外见于印度东部，缅甸东部，泰国，越南，老挝，马来西亚，苏门答腊和加里曼丹等地。

形态和量衡度见种的描述。

Picumnus innominatus malayorum Hartert, 1912, Vog. pal. Faun., 2: 937 (马来半岛: Gounong Ijau); Peters, 1948, 6: 97; 郑作新, 1976, 356.

(3) 华南亚种 *Picumnus innominatus chinensis* (Hargitt)

见于长江以南各省，西至四川峨眉山、雅安及云南西北部，北抵甘肃南部、陕西南部及河南南部桐柏山。国外只见于越南东北部。

头顶全为淡栗色，上体沾棕，两翼表面尤为显著，下体的黑斑也较粗著。头顶暗栗，背面橄榄绿色。

Vivia chinensis Hargitt, 1881, Ibis, 228, 图版 7 (浙江梅溪).

Picumnus innominatus chinensis Peters, 1948, 6: 97; 郑作新, 1976, 356.

生态 栖息于山地灌丛、竹林间。喜在枯树上活动。常单个或成对与鸫、山雀等小鸟于竹林或乔木林中的亚乔木上混合活动，攀缘于低矮的小树和灌丛的枝条上。形小而行动敏捷，不易遇见。啄木节奏较其他啄木鸟慢。食物主要是蚁类及蚁卵等。在秦岭，于8—9月间剖验5个鸟胃，除一胃内还见些甲虫外，其余都是蚂蚁。李桂垣等(1985)在四川解剖过11个鸟胃，食物有甲虫(7次)、蚂蚁和其他昆虫(各3次)，均为动物物质。

巢营于树洞中。

经济意义 此鸟啄食害虫，对人类有益。