

	(6 ♂♂)	(7 ♂♂)	(35—40)	(139—149)	(104—123)	(26—29)
♀♀(10)	140—168	285—332	37.0	144	115.2	27.3
	(5♀♀)	(7♀♀)	(32—38)	(136—149)	(105—122)	(26—28)

*Picus canus setschuanus*, Hesse 1911, Orn. Monatsb., 19: 193 (四川康定); Peters, 1948, 6: 136; 郑作新, 1976, 360.

**(6) 西南亚种 *Picus canus sordidior* (Rippon)**

仅分布于西藏东部林芝、波密以东地区, 四川西北部, 云南西北部贡山、德钦、丽江以至西部泸水、腾冲、潞西和西南部(留鸟)。此是中国特产亚种。

和西藏亚种比, 本亚种胸、腹部呈淡绿灰色; 体形也偏大, 翅长 4 ♂♂ 146—154。

*Gecinus sordidior* Rippon, 1906, Bull. Brit. Orn. Cl., 19: 32 (云南金沙江)。

*Picus canus sordidior* Peters, 1948, 6: 137; 郑作新, 1976, 360.

**(7) 西藏亚种 *Picus canus gyldenstoepei* Stuart Baker**

西藏南部樟木、东南部墨脱(留鸟)。国外分布于尼泊尔东部, 锡金和印度阿萨姆, 孟加拉南部, 缅甸西北部。

和西南亚种相比, 本亚种上体呈褐绿色; 次级飞羽和三级飞羽及其覆羽褐黄色也较西南亚种更为显著。翅长 1 ♂ 145。头枕部具黑色斑块, 上体暗绿色, 腰及尾上覆羽辉黄绿色, 翅上覆羽及飞羽沾黄褐色甚显著, 下体橄榄绿而明显沾黄。与 *P. c. sanguiniceps* 比较, 后者体羽纯暗绿色, 体形较大, 翅长 ♂♂ 160.6 (157—165), 而本亚种为 143.2 (140—149), 体形较小。青海亚种羽色淡灰绿色, 体形较大, 翅长 8 ♂♂ 151.5 (149—155)。西南亚种下体淡灰橄榄绿色。上体呈辉亮的金黄色光泽, 特别是内侧飞羽表面。上体的光泽亦较弱, 多橄榄绿。

√量衡度 (据 Baker, 1927; mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♀			33—38	137—150	98—104	27—28

*Picus canus gyldenstoepei* Stuart Baker, 1918, Bull. Brit. Orn. Cl., 39: 19 (印度的 Sadiya, Lakhimpur, Assam,); Peters, 1948, 6: 137.

**(8) 云南亚种 *Picus canus hessei* Gyldesnstolpe**

云南南部西双版纳(留鸟)。国外分布于缅甸和中南半岛三国。

与青海亚种相比较: 体形大小相似或略小(翅长 145—158), 上体呈橄榄绿色而非灰绿色; 比国内其他亚种则体形大, 其他亚种的翅长在 150 以下。

量衡度 (据 Baker, 1927; mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♀			35—45	144—158	100—107	28—29

*Picus canus hessei* Gyldesnstolpe, 1916, Orn. Monatsb., 24: 28 (Pakkoh and Denchai, northern Thailand); Peters, 1948, 6: 137.

### (9) 华东亚种 *Picus canus guerini* (Malherbe)

仅分布于甘肃的陇东和陇南全境, 陕西南部, 山西南部, 湖北, 江西九江, 安徽北部, 江苏, 浙江 (留鸟)。此亚种是中国特产。

背部的绿色与翼上的黄褐色及下体的灰绿色均较河北亚种深浓, 但较四川亚种及西藏亚种为差淡; 头上的黑纹和后颈的黑块亦均较河北亚种发达, 但却不及四川亚种。

✓量衡度 (据郑作新等, 1973; mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♂ (5)	149	288	37.9	145.4	114	28.6
	(145—159)	(282—295)	(36—39)	(142—149)	(110—123)	(27—30)
♀ ♀ (5)	141	298	37.9	145.6	114.4	18.6
	(131—150)	(290—321)	(35.5—40)	(142—150)	(142—150)	(28—29.5)

*Chloropicus guerini* Malherbe, 1849, Rev. Mag. Zool., 539 (上海及浙江宁波)。

*Picus canus guerini* Peters, 1948, 6: 136; 郑作新, 1976, 360.

### (10) 华南亚种 *Picus canus sobrinus* Peters

云南东南部河口、马关、富宁, 湖南, 广西, 广东, 安徽南部, 福建 (留鸟)。国外仅分布于越南北部。所以此亚种亦可以说是中国特产。

量衡度 (广东标本; mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♂ (13)	146.2	288	37.5	138.2	99	26
	(145—154)	(278—291)	(36—40)	(135—145)	(94—105)	(25—27)
♀ ♀ (16)	148.2	290.1	37	138.5	97.8	26.2
	(145—156)	(289—293)	(35—40)	(136—145)	(96—106)	(25—27)

*Picus canus sobrinus* Peters, 1948, Checklish Bds. World, 6: 136; nom. nov. for:

*Picus canus ricketti* Stuart Baker, 1919, Ibis, 187 (福建); nec. *P. flavinucha ricketti* Styan, 1898.

*Picus canus sobrinus* Peters, 1948, 6: 136; 郑作新, 1976, 360.