

	(6 ♂♂)	(7 ♂♂)	(35—40)	(139—149)	(104—123)	(26—29)
♀♀(10)	140—168	285—332	37.0	144	115.2	27.3
	(5♀♀)	(7♀♀)	(32—38)	(136—149)	(105—122)	(26—28)

Picus canus setschuanus, Hesse 1911, Orn. Monatsb., 19: 193 (四川康定); Peters, 1948, 6: 136; 郑作新, 1976, 360.

(6) 西南亚种 *Picus canus sordidior* (Rippon)

仅分布于西藏东部林芝、波密以东地区, 四川西北部, 云南西北部贡山、德钦、丽江以至西部泸水、腾冲、潞西和西南部(留鸟)。此是中国特产亚种。

和西藏亚种比, 本亚种胸、腹部呈淡绿灰色; 体形也偏大, 翅长 4 ♂♂ 146—154。

Gecinus sordidior Rippon, 1906, Bull. Brit. Orn. Cl., 19: 32 (云南金沙江)。

Picus canus sordidior Peters, 1948, 6: 137; 郑作新, 1976, 360.

(7) 西藏亚种 *Picus canus gyldenstoepei* Stuart Baker

西藏南部樟木、东南部墨脱(留鸟)。国外分布于尼泊尔东部, 锡金和印度阿萨姆, 孟加拉南部, 缅甸西北部。

和西南亚种相比, 本亚种上体呈褐绿色; 次级飞羽和三级飞羽及其覆羽褐黄色也较西南亚种更为显著。翅长 1 ♂ 145。头枕部具黑色斑块, 上体暗绿色, 腰及尾上覆羽辉黄绿色, 翅上覆羽及飞羽沾黄褐色甚显著, 下体橄榄绿而明显沾黄。与 *P. c. sanguiniceps* 比较, 后者体羽纯暗绿色, 体形较大, 翅长 ♂♂ 160.6 (157—165), 而本亚种为 143.2 (140—149), 体形较小。青海亚种羽色淡灰绿色, 体形较大, 翅长 8 ♂♂ 151.5 (149—155)。西南亚种下体淡灰橄榄绿色。上体呈辉亮的金黄色光泽, 特别是内侧飞羽表面。上体的光泽亦较弱, 多橄榄绿。

√量衡度 (据 Baker, 1927; mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♀			33—38	137—150	98—104	27—28

Picus canus gyldenstoepei Stuart Baker, 1918, Bull. Brit. Orn. Cl., 39: 19 (印度的 Sadiya, Lakhimpur, Assam,); Peters, 1948, 6: 137.

(8) 云南亚种 *Picus canus hessei* Gyldesnstolpe

云南南部西双版纳(留鸟)。国外分布于缅甸和中南半岛三国。

与青海亚种相比较: 体形大小相似或略小(翅长 145—158), 上体呈橄榄绿色而非灰绿色; 比国内其他亚种则体形大, 其他亚种的翅长在 150 以下。