

亚种检索表

1. 翼长在 142 mm 以上; 颈冠柠檬黄色…………… 福建亚种 *P. c. citrinocristatus*
翼长在 142 mm 以下…………… 2
2. 颈冠金黄色; 胸呈暗橄榄绿褐色…………… 云南亚种 *P. c. chlorolophoides*
颈冠绿黄色; 胸及上腹均纯暗橄榄绿色…………… 海南亚种 *P. c. longipennis*

(1) 云南亚种 *Picus chlorolophus chlorolophoides* (Gyldenstolpe)

云南西部腾冲和潞西, 西南部耿马、沧源, 南部思茅、西双版纳 (留鸟)。国外见于缅甸中部到泰国北部。

形态和量衡度见种的描述。

Brachylophus chlorolophoides Gyldenstolpe, 1916, Orn. Monatsb., 24: 29 (泰国: Khun Tan).

Picus chlorolophus chlorolophoides Peters, 1948, 6: 140—141; 郑作新, 1976, 362—363.

(2) 福建亚种 *Picus chlorolophus citrinocristatus* (Rickett)

福建中部 (留鸟)。国外仅分布于越南北部。

体形较国内其他两个亚种大, 颈冠柠檬黄色; 胸、腹部橄榄绿色。

量衡度 (据 La Touche, 1931—1934; mm, g): 嘴峰 39, 翅 175, 尾 138, 跗蹠 29。

Gecinus citrinocristatus Rickett, 1901, Bull. Brit. Orn. Cl., 11: 46 (福建南平附近野猫坑)。

Picus chlorolophus citrinocristatus Peters, 1948, 6: 141; 郑作新, 1976, 363.

(3) 海南亚种 *Picus chlorolophus longipennis* (Hartert)

分布仅限于海南 (留鸟)。此亚种是中国特产。

体形最小, 翅长在 130 mm 以下; 颈冠绿黄色, 胸、腹部暗橄榄绿色。

量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (5)	62—74	232—256	22—25	121—131	90—104	20—24
♀♀ (4)	64—74	238—255	22—25	124—130	90—102	20—24

Gecinus chlorigaster longipennis Hartert, 1910, Nov. Zool., 17: 222 (海南五指山)。

Picus chlorolophus longipennis Peters, 1948, 6: 141; 郑作新, 1976, 363.