

- ..... 华南亚种 *P. f. ricketti*  
 头顶橄榄绿而缀以棕褐色；雄鸟颊和喉及颧区均鲜黄色 ..... 3  
 3. 体形较小，翼长 6 ♂♂ 164—169 mm；背部较少黄色；下体较多橄榄色 ..... 云南亚种 *P. f. lylei*  
 体形较大，翼长 3 ♂♀ 169—174 mm；背部较多黄色；下体较多灰色 .....  
 ..... 指名亚种 *P. f. flavinucha*

**(1) 指名亚种 *Picus flavinucha flavinucha* Gould**

西藏昌都地区西南部，云南西部潞西、龙陵，西南部永德、沧源，南部勐连、勐海（留鸟）。国外分布于喜马拉雅山脉东部从尼泊尔至印度阿萨姆北部。

尾长 130—142。背部黄色较重；雄鸟颊、喉为硫磺色；体形较大，翅长 6 ♂♂♀♀ 169—174。头顶暗橄榄绿色，仅前部缀以棕褐色；上体的绿色稍沾黄彩；颈冠橙黄色；雄鸟的颊和喉硫黄色。与云南亚种相较，颈冠的黄色较多橙彩；雄鸟下喉的纵纹也显著较黑。

*Picus flavinucha* Gould, 1834 (1833), Proc. Zool. Soc. London, 120 (喜马拉雅山脉地区)。

*Picus flavinucha flavinucha* Peters, 1948, 6: 138; 郑作新, 1976, 361.

**(2) 云南亚种 *Picus flavinucha lylei* (Kloss)**

西藏东南部墨脱，云南南部绿春、西双版纳（留鸟）。国外分布于泰国北部、西部和西南部。

喉部黄色浅淡，呈黄白色或浅黄色；翅较短（4 ♂♂ 157—173，3 ♀♀ 160—171）。

*Chrysophlegma flavinucha lylei* Kloss, 1918, Ibis, 110 (泰国西南部: Koh Lak)。

*Picus flavinucha lylei* Peters, 1948, 6: 139; 郑作新, 1976, 361.

**(3) 海南亚种 *Picus flavinucha styani* (Ogilie-Grant)**

广西南部，海南（留鸟）。国外分布于越南东北部。

头顶为纯栗褐色；下体浓暗，呈烟褐沾橄榄色；体形较小（1 ♂翼 149，尾 109）。

*Chrysophlegma styani* Ogilie-Grant, 1899, Ibis, 585 (海南岛五指山)。

*Picus flavinucha styani*, Peters, 1948, 6: 139; 郑作新, 1976, 362.

**(4) 华南亚种 *Picus flavinucha ricketti* (Styan)**

仅分布于四川马边，福建中部（留鸟）。此亚种是中国特产。

*Chrysophlegma ricketti* Styan, 1898, Bull. Brit. Orn. Cl., 7: 40 (福建)。

*Picus flavinucha ricketti* Peters, 1948, 6: 139; 郑作新, 1976, 362.