

虹膜红色；上嘴黑色，下嘴褐灰色；跗蹠黑褐色。

√量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	140—142	—	—	1♂142	—	—
♀♀(3)	133—153	—	—	139—143	—	—

亚种分化 花腹啄木鸟分化为4个亚种，而在我国仅有1个亚种。

### (1) 云南亚种 *Picus vittatus eisenhoferi* Gyldenstolpe

国内仅分布于云南南部西双版纳（留鸟）。国外见于缅甸，泰国，越南，老挝和柬埔寨。形态和量衡度见种的描述。

*Picus vittatus eisenhoferi* Gyldenstolpe, 1916, Orn. Monatsb., 24: 28 (泰国: Pa Hing, Phrae Province); Peters, 1948, 6: 134; 郑作新, 1976, 358.

**生态** 栖息在山脚和低海拔的热带雨林中。食物为昆虫。巢洞营于树干或大的枝条上。

**经济意义** 此鸟数量稀少，它们嗜食害虫，对人有益，应给以保护。

*Picus vittatus* Vieillot, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., 26: 91 (印度尼西亚: 爪哇).

## 7. 鳞喉啄木鸟 *Picus xanthopygaeus* J. E. et G. R. Gray, 1846

英文名: Little Scaly-bellied Green Woodpecker, Scaly-throated Woodpecker.

**地理分布** 我国仅见于云南西部。在国外，分布于印度，斯里兰卡，尼泊尔，锡金，缅甸，泰国，越南和柬埔寨。

**鉴别特征** 喉、胸、腹均有U形鳞状纹。头顶红色；背和翼上覆羽草绿色；腰部亮黄色；尾羽绿褐色；下体的颊、喉黄灰色；前颈和胸绿色；胁和尾下覆羽淡绿黄色。

**形态** (据杨岚等, 1995.)

**雄性成鸟** 头顶红色，头顶后部羽毛有时具橙色先端，枕部有黑显露；背及翼上覆羽草绿色，有时渲染黄色，有时较多橄榄色；腰部亮黄色，极少渲染橙色；初级飞羽暗褐色，外羽片和内羽片基部具白斑；最内侧次级飞羽染浓绿色，并具不明显的绿黄色横斑，外侧飞羽逐渐与初级飞羽趋于同色；尾羽绿褐色，在基部有不明显白斑，最外侧尾羽浅褐，整片羽毛均具较宽阔斑纹；眼至枕部具一白色眉纹，其上方有一黑纹；眼先暗黄白色；耳羽淡灰褐色，具较白的纵纹；两颊灰白具不明显的黑色纵纹；颊、喉黄灰色，具白色纵纹；前颈及胸部绿色较多，具不太明显的暗色鳞状纹；胁及尾下覆羽淡绿黄色，具宽阔的黑色鳞片状纹。下体羽色变化较大。

**雌性成鸟** 与雄鸟相似，但头顶黑色，头侧羽色较褐且暗。

虹膜红色，具一粉红色外圈；嘴峰角黄色，上嘴较暗较褐；跗蹠橄榄绿或橄榄灰色。

√量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
		300		122—130		

**生态** 栖于开阔山地桦树林、竹林中，常至地面活动。食物为昆虫。

**经济意义** 此鸟自 1926 年 Rothschild 报道采自腾冲以后，一直未见该种在中国报道，在云南亦未采到标本，所以此种是中国的罕见种，应好好加以保护。

*Picus striolatus* Blyth, 1843, Journ. As. Soc. Bengal, 12: 1000 (喜马拉雅山及印度中部); nec *P. striolatus* Lesson, 1831, nor of MacGillivray, 1840.

*Picus xanthopygaeus* Peters, 1948, 6: 134—135; 郑作新, 1976, 358.

### 8. 灰头啄木鸟 *Picus canus* Gmelin, 1788

**别名**: 山裂 (辞典), 山啄木、火老鸦 (本草), 绿喷打木、香喷打木 (北名), 黄啄木 (南名), 绿啄木。

**英文名**: Black-naped Green Woodpecker, Grey-headed Woodpecker, Grey-faced Woodpecker.

**地理分布** 除内蒙古外，全国各省、自治区均有分布，分成许多亚种。在国外，终年留居于挪威，向东经德国、前苏联至日本，南至阿尔卑斯山、巴尔干半岛至东南亚各地。

**鉴别特征** 通体绿色，雄鸟前头有红斑。

**形态** (依据青海亚种描述，标本采自青海门源和大通。)

**雄性成鸟** 额和头顶鲜红色；枕和后颈黑色；眼先具黑色纵纹；脸和耳羽灰色；脸与喉之间有黑色纵纹。翕、背、腰为灰绿色，尾上覆羽金黄色；尾羽灰褐色，有许多宽阔的白色横斑；飞羽灰褐色，初级飞羽外羽片具白色圆斑，内羽片具白色大横斑；次级飞羽外羽片黄绿色，内羽片边缘有大的白斑。下体的颊、喉为带点绿的灰白色；前颈、胸、腹和两胁灰绿色；尾下覆羽基部黑色，端部灰色。

**雌性成鸟** 与雄鸟相似，但额和头顶无血红色，代之则是黑色，其余的则完全相同。

虹膜红色或土黄色；嘴褐黑色，下嘴基部肉色或橄榄黄色；跗蹠及趾灰黑色，爪褐色。

√量衡度 (mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (10)	144.7	304	38.6	149.9	99.3	26.1