

分布于新疆北部阿勒泰、西部天山屈拉克铁列克(夏候鸟)。国外见于伊朗东部,阿富汗北部,外里海,苏联土耳其斯坦北部等地。冬季在阿富汗南部,印度西北部至班加罗尔等地。

形态详见前文。

Anthus campestris griseus Nicoll 1920, Bull. Brit. Orn. Cl. 41:25(模式产地: 苏联 Tischen, Turkestan)。

(2) 北方亚种 *Anthus campestris godlewskii* (Taczanowski)

分布于东北西北部满洲里,内蒙古东部高原,青海东部、东南部斑玛、南部玉树(繁殖鸟,旅鸟);东北南部,河北,山西,内蒙古伊克昭盟,宁夏贺兰山,甘肃,四川西北部石渠、西部巴塘,西藏南部拉萨、昌都地区北部、东南部和西南部(旅鸟)。国外分布于外贝加尔南部,蒙古,锡金,冬季在印度,锡兰。

上体色较 *A. c. griseus* 暗浓,呈黑褐色,腰和尾上覆羽沙褐色;尾羽黑褐,中央一对尾羽具赭色宽边,最外侧一对尾羽白色,内翮一半为白色,次一对尾羽亦白色,内翮仅具白端,羽轴呈暗褐色;翼羽暗褐,边缘沙黄色,下体沙黄色,胸部色较浓,并具暗褐色纵纹。

虹膜暗褐色;嘴先端暗褐色,嘴基淡褐色;跗蹠和趾淡褐色,爪褐色,后爪淡黄色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	25	—	13	91	79	24
♀♀(4)	24,26	—,—	12,12	84,84	68,72	25,25.5
	27,30	151,154	14,15	85,86	73,74	26,27

Agrodroma Godlewskii Taczanowski, 1876, Bull. Soc. Zool. France 1:158 (模式产地: 西伯利亚达乌尔地区南部)。

Anthus striolatus Blyth, 1847, Journ. As. Soc. Bengal 16:435 (模式产地: 印度大吉岭); *nec A. striolatus* Gray, 1846.

Corydalla thermophilus Jerdon, 1863, Bds. Ind. 2:233; 认为是 *C. striolata* 的同物异名。

生态 栖息于河滩、谷地、沼泽、草地、林间空地及居民点附近。多成对活动,在地上、岩石间奔走觅食,受惊动即飞向树枝或岩石上,鸣声尖锐。

食物几纯为昆虫,多为鞘翅目、膜翅目、双翅目的昆虫及幼虫,在食物缺乏时吃少量植物性食物。

巢筑在水边、河边、沼泽地附近的草地上较凹的地方或草丛根旁,由草茎、叶所构成,内垫以软草、兽毛等,通常产 5—6 枚卵,卵色变化较大,有的呈褐灰色或者是淡褐灰色,满布以褐色的斑点。

Anthus campestris Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1:166 (模式产地: 瑞典)。

Anthus campestris, 郑作新, 1976, 420—421; Baker, 1926, 3:292—293; Деметьев 1954, 5:653—660; Howard, 1980, 356; Peters, 1960, 9:152; Vaurie, 1959, 63—64. *Anthus campestris griseus*, 钱燕文, 1965, 99. *Anthus campestris godlewskii*, La Touche, 1925—1930, 435—437.

8. 林鹞 *Anthus trivialis* (Linnaeus)

地理分布 分布于新疆西北部、天山西部,西藏西北部等地。在欧洲南至地中海地