

翅长: ♂♂ 72.5, ♀♀ 72—74 毫米。

Anthus gustavi menzbieri Шулпин, 1927, Ежег. Зоол. Муз. Акад. Наук 28: 402 (模式产地: 东北兴凯湖)。

(2) 指名亚种 *Anthus gustavi gustavi* Swinhoe

分布于东北中部哈尔滨、南部旅顺、西南部朝阳,河北、山东、江苏、福建,台湾、广东(旅鸟);江西(? 夏候鸟——David)。国外分布于苏联北部,迁徙鸟见于朝鲜,日本,琉球群岛,菲律宾及印度尼西亚等地。

形态详见前文。

Anthus gustavi Swinhoe, 1863, Proc. Zool. Soc. London: 90 (模式产地: 福建厦门)。

生态 栖息于河滩、海滨、灌木丛及田野、林缘地区,多单个或成对活动。在低湿的草地奔走觅食,鸣声尖细。


筑巢在地上和较隐蔽处,巢由禾本科植物构成,6月初可见到雏鸟。

Anthus gustavi Swinhoe, 1863, Proc. Zool. Soc. London: 90(模式产地: 福建厦门)。

Anthus gustavi, 寿振黄, 1936, 785—786; 郑作新, 1976, 423—424; Дементьев 1954, 5: 671—677; Howard, 1980, 357; La Touche, 1925—1930, 423—425; Peters, 1960, 9: 158—159 Vaurie, 1959, 68—69.

11. 草地鹨 *Anthus pratensis* (Linnaeus)

地理分布 分布于新疆西部(冬候鸟);天山(罕见旅鸟)。国外分布于古北区西部,苏联伯朝拉河地区,乌拉尔北部,鄂毕河一带,西伯利亚西北部等,格陵兰东北部,冰岛,法罗群岛,不列颠群岛,法国南部,意大利北部,南斯拉夫等;冬天见于北非,克里米亚,高加索,



分布图 43 草地鹨 *Anthus pratensis pratensis*