

分布图 42 北鹡 *Anthus gustavi*

1. *A. g. menzbieri* ○      2. *A. g. gustavi*

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(8)	12.1 (11—13)	82.3 (77—91)	62.4 (56—68)	22.9
♀(1)	12	81	64	23
♀(2)	11,12	77,81	56,61	22, 23

**分类讨论** *Anthus gustavi* 原分为两个亚种, Hans Johansen (1952) 又分出一个亚种 *A. g. commandorensis*, 采于康曼德群岛, 划分此亚种的依据是: *A. g. commandorensis* 体色较 *gustavi* 淡, 翅长 ♂ 83—88, *gustavi* ♂ 82—84。但依我们 *gustavi* 的标本 8♂♂ 72—91, 就以翅长来分, *commandorensis* 是不能成立的。ДЕМЕНТЬЕВ (1954) 测量 *gustavi* 雄性翅长为 83 和 84 毫米, 雌性翅长 80、81 和 82 毫米, 而我们的 *gustavi* 翅长度度雄性有的小于 83 毫米, 有的大于 88 毫米, 雌性有的小于 80 毫米, 最大的也小于 82 毫米, 限于标本数量, 难以论断, 待今后进一步考证。

**亚种分化** 北鹡分 3 个亚种, 分布于中国的有 2 个亚种, 检索如下:

- 上体较淡, 纵纹较少; 下体乳白 ..... 指名亚种 *A. g. gustavi*
- 上体较暗, 纵纹较多; 下体较黄; 尾下覆羽近棕黄色 ..... 东北亚种 *A. g. menzbieri*

**(1) 东北亚种 *Anthus gustavi menzbieri* Shulpin**

分布于东北兴凯湖(繁殖鸟); 黑龙江爱辉。国外见于乌苏里南部。

与指名亚种 (*A. g. gustavi*) 相比, 上体较暗, 呈深灰褐色, 纵纹较多, 背部羽毛的边缘杂有白斑, 下体白色沾黄, 尾下覆羽近棕黄色。

翅长: ♂♂ 72.5, ♀♀ 72—74 毫米。

*Anthus gustavi menzbieri* Шулпин, 1927, Ежег. Зоол. Муз. Акад. Наук 28: 402 (模式产地: 东北兴凯湖)。

## (2) 指名亚种 *Anthus gustavi gustavi* Swinhoe

分布于东北中部哈尔滨、南部旅顺、西南部朝阳,河北、山东、江苏、福建,台湾、广东(旅鸟);江西(? 夏候鸟——David)。国外分布于苏联北部,迁徙鸟见于朝鲜,日本,琉球群岛,菲律宾及印度尼西亚等地。

形态详见前文。

*Anthus gustavi* Swinhoe, 1863, Proc. Zool. Soc. London: 90 (模式产地: 福建厦门)。

**生态** 栖息于河滩、海滨、灌木丛及田野、林缘地区,多单个或成对活动。在低湿的草地奔走觅食,鸣声尖细。


筑巢在地上和较隐蔽处,巢由禾本科植物构成,6月初可见到雏鸟。

*Anthus gustavi* Swinhoe, 1863, Proc. Zool. Soc. London: 90(模式产地: 福建厦门)。

*Anthus gustavi*, 寿振黄, 1936, 785—786; 郑作新, 1976, 423—424; Дементьев 1954, 5: 671—677; Howard, 1980, 357; La Touche, 1925—1930, 423—425; Peters, 1960, 9: 158—159 Vaurie, 1959, 68—69.

## 11. 草地鹨 *Anthus pratensis* (Linnaeus)

**地理分布** 分布于新疆西部(冬候鸟);天山(罕见旅鸟)。国外分布于古北区西部,苏联伯朝拉河地区,乌拉尔北部,鄂毕河一带,西伯利亚西北部等,格陵兰东北部,冰岛,法罗群岛,不列颠群岛,法国南部,意大利北部,南斯拉夫等;冬天见于北非,克里米亚,高加索,



分布图 43 草地鹨 *Anthus pratensis pratensis*