

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (5)	31.0 (30—34)	182.2 (170—190)	20.3 (19.5—21.5)	91.6 (86.5—94.5)	71.3 (68.5—73.5)	18.6 (17.5—19.5)
♀♀ (6)	30.5 (29—32)	180.5 (165—190)	19.5 (18.5—20.5)	88.7 (85—92.5)	66.8 (65.5—69)	17.5 (16—19)

亚种分化 计7个亚种,见于中国仅1个亚种。

(1) 云南亚种 *Chloropsis aurifrons pridii* Deignan

滇西高原盈江及云南西南部永德、沧源、西盟(留鸟)。国外见于缅甸南部,老挝北部和中部,泰国北部至西部达府。

形态描述见前文。

Chloropsis aurifrons pridii Deignan, 1946, *Smiths. Misc. Coll.* 106(12):2 (模式产地: 泰国西北部 Doi Ang Ka, 或 Doi Inthanon)。


生态 栖息于海拔约1,600米以下的开阔常绿阔叶林。数量稀少。小群活动,有时也见单独活动。性活泼。鸣声悦耳。

采自1月的1只胃内有花和果实。3月采的3只胃内纯为榕果。

1978年12月13日在云南西南部沧源南腊获得1只雌性幼鸟,前头淡草绿色,散有金桔色羽片;翼缘钴蓝;余与雌鸟同。

Phyllornis aurifrons Temminck, 1829, in *Temminck et Laugier*, *Pl. col. Ois.* 81:图版484(模式产地: 苏门答腊,错误;应为印度卡恰尔 Cachar, 据 Baker)。

Chloropsis aurifrons, 郑作新, 1976, 457; *Mayr et Greenway*, 1960, 9: 305—306; *Smythies*, 1953, 81—82.



分布图 80 橙腹叶鹎 *Chloropsis hardwickei*

1. *C. h. hardwickei* ● 2. *C. h. melliana* ○ 3. *C. h. lazulina* ⊙