

- 上体较淡棕褐而带粉红;额、脸和喉均白..... 东北亚种 *E. a. brandti*
 上体似 *brandti*, 但较近砂色;嘴较细长 柴达木亚种 *E. a. przewalskii*
 4. 后颈与上背呈浓葡萄红色;下背黑褐色纵纹较著..... 四川亚种 *E. a. khamensis*
 后颈与上背较淡;下背纵纹较窄,褐色较差淡..... 青藏亚种 *E. a. elwesi*
 上体较 *elwesi* 还淡,而更近砂色,但较 *teleschowi* 稍暗 昆仑亚种 *E. a. argalea*
 上体最淡;前额无白色带斑,足与其它亚种相区别..... 南疆亚种 *E. a. teleschowi*

(1) 北方亚种 *Eremophila alpestris flava* (Gmelin)

此亚种在中国为旅鸟和冬候鸟,见于内蒙古东北呼伦贝尔盟、林西,黑龙江西北部齐齐哈尔的东南林甸、杜尔伯特,河北北部及中部。国外主要分布在欧洲,北极地区及其岛屿,如新地岛;西部南到瑞典的耶姆特兰,苏联东部、贝加尔湖北部。在迁徙时或冬季,亦见于英国、法国、欧洲中部和东南部,还偶见于西班牙、意大利、马耳他及日本北部。

上体褐色;稍沾粉红色彩,前额、脸和喉带黄色;头侧的黑色与同色的胸相分离,隔以白纹。

量度: (据 La Touche 1925—30)

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂		(114.5—122)	(73—80)	
♀		(105—111)	(63—70)	
	11(1↑12)*			21—22*

*原文未注明雌雄。

Alauda flava Gmelin, 1789, Syst. Nat., ed. 13, 1: 800 (模式产地: 西伯利亚叶尼塞河, 据 Meinertzhagen)。

(2) 东北亚种 *Eremophila alpestris brandti* (Dresser)

繁殖于新疆北部托里、吉木乃和布克赛尔(郑宝斋, 1965)中部博格多山、哈密山东部;东北西北部呼伦贝尔盟博格图及满洲里;内蒙古中部乌拉尔旗和伊克昭盟、西部阿拉善;山西北部,甘肃东北部,宁夏海原,甘肃西部兰州,青海东部西宁,河北(冬候鸟)。

量度: (据 La Touche 1925—30)

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
	108			
3♂♂	(10.5—11)	109,111	(80—81)	(20—20.5)(3♂)
		102		
据郑宝斋		106,113		
		105,110		
2♀♀				

Otocorys brandti Dresser, 1874, Hist. Europe 4: 397 (模式产地: 苏联 Kirghiz Steppe)

(3) 新疆亚种 *Eremophila alpestris albogularis* Bonaparte

地理分布见种的叙述。

本亚种的前额几无黑色,仅在额基两侧有一小点黑羽,颊部的黑色和同色的胸相联结,前额、脸部和喉部通常为白色,无黄色或稍带黄色,易与其它亚种相区别。