

本古特 (Benguet), 菲律宾吕宋等地。

鉴别特征 体形似家燕但比家燕略小, 体羽色黑具金属绿色光泽, 腰深蓝, 下体无条纹; 两翅折合时伸达尾羽之后, 前颈无蓝黑色横带。

形态 (*H. t. namiyei*, 据内田清之助, 1974)

成鸟: 前头栗色, 其余上体、尾羽色黑而有绿色金属光泽。眼先绒黑, 颊、颏、喉和前颈鲜茶淡褐色, 微渲染棕黄, 至胸部稍淡; 耳羽上部蓝黑, 下部淡褐; 颈侧浅蓝黑色且由侧方延伸至胸部两侧, 形成似新月形的色斑, 使得颈部的淡褐色同下体其余部分稍为分开; 翅深褐; 尾暗褐色, 尾羽除中央一对外, 其余内翮近尖端悉具斜形椭圆白色斑, 最外侧一对尾羽白斑不著; 尾下覆羽尖端绒黑且饰以白边。下体淡灰渲染黄色, 近腹中线的每枚羽均饰以白缘。

虹膜褐色; 嘴黑色; 跗蹠及趾角褐色。

幼鸟: 形似成鸟, 但上体缺蓝绿色金属光泽, 额羽的栗色不大明显; 颏、喉和胸的栗色较淡, 其余烟白且微渲染粉红, 内侧飞羽及其覆羽均缀以白色边缘, 羽端粉红色。

如成鸟一样, 洋燕幼鸟的尾亦较其它燕幼鸟要短。

量度: [据小林桂助 (1965) 和内田清之助 (1974)]

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀	(7-9)	(108-113)	(46-54)	(10-11)

亚种分化 洋燕全世界已知有 11 个亚种。中国分布有 2 亚种。

体大, 翅长 110 毫米以上; 尾叉 14 毫米, 上体光泽淡绿; 喉较暗栗 台湾亚种 *H. t. namiyei*
 体小, 翅长多在 105 毫米以下; 尾叉 7-10 毫米, 上体光泽蓝绿; 喉淡栗 兰屿亚种 *H. t. abbotti*

(1) 台湾亚种 *Hirundo tahitica namiyei* (Stejneger)

在台湾为留鸟。国外见于冲绳、塔希提岛 (Tahiti)。

与 *H. t. abbotti* 主要区别为体形较大, 嘴亦较长, 尾叉亦较深; 上体淡绿, 喉的褐色更栗。

形态详见前文。

Chelidon namiyei Stejneger, 1886, Proc. U. S. Nat. Mus. 9: 646 (模式产地: 冲绳岛 Urassomagiri)。

(2) 兰屿亚种 *Hirundo tahitica abbotti* (Oberholser)

分布于台湾蓝屿和火烧岛, 为繁殖鸟。国外见于普洛曼加纳岛 (Pulo Manguan) 和阿南巴斯岛 (Anamba)。

本亚种和 *namiyei* 的区别除了体型较小外, 嘴亦较短, 其长度在 7 毫米以下; 尾叉亦浅, 通常都在 10 毫米以下; 上体呈紫蓝绿色光泽, 不像 *namiyei* 更为绿淡, 喉部褐色也较 *namiyei* 为淡。

Hypurolepis javanica abbotti Oberholser, 1917, Bull. U. S. Nat. Mus. 98: 32 (模式产地: 印度洋 Pulo Manguan, Anambas Is)。