

为地方性留鸟。分布于西藏南部亚东、浪卡子、吉隆、定日、卡拉、定结、纳木湖、安多；西南部普兰、昌都地区西南；四川西北部；青海玉树、果洛。国外见于锡金和不丹北部。

与 *M. m. holdereri* 相似，仅上体羽色较暗、羽轴纹近黑色，羽缘呈灰棕，相衬之下，背部显较浓密的条纹。

幼鸟：上体黑褐，各羽均具黄色或黄白色羽缘，形成斑杂状。下体淡黄，胸部及两胁具较深的暗褐斑；颈、喉和颈侧的黄色尤明显，8月所采的幼鸟嘴长比成鸟尚短五分之一左右，其它量度多与成鸟接近。9月采自西藏的幼鸟，仅颈侧尚具明显的乳黄色，其余已酷似成鸟。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
	85.4	211.3	22.1	145.1	87.4	28.3
♂♂(10)	(72—92)	(190—238)	(20—23)	(141—152)	(84—96)	(24—31)
♀♀(7)	(60—69)	(190—223)	(18—21)	(118—130)	(68—84)	(27—30)
幼♂♂(2)	75	220	(16—17)	(125—126)	(71—80.5)	(31—30)

Melanocorypha maxima Blyth ex Gould, 1867, Ibis: 46 (模式产地：锡金)。

(2) 青海亚种 *Melanocorypha maxima holdereri* Reichenow

分布于西藏阿里地区噶尔县，向东至祁连山西部哈拉河和党河南山（洪波特尔山）、天峻县、青海湖、鄂陵湖等。国外见于克什米尔地区。

形态详见前文。

幼鸟亦似 *M. m. maxima* 之幼鸟，但色也显较淡，多黄棕色，亦类似成鸟间的差异。

Melanocorypha holdereri Reichenow, 1911, Orn. Monatsb. 19:34 (模式产地：甘肃：Kloster Schinse)。

Melanocorypha maxima subgrisea Stegmann, 1937, Orn. Monatsb. 45(2): 55 (模式产地：青海鄂陵湖)。

生态 这种鸟虽然也是草原鸟类，但它的栖息环境多在较湿润的草甸草原地区或沼泽地方。这些环境，草一般比较高，往往有由于地势高低凹凸形成的草墩，所以在湖泊周围、河湾、纳滩地最易见到。虽然它们的栖息地比较局限和固定，但并不见成群活动和迁飞，总是成对或单个的分散在这一栖息地区，似乎各自占有一片地盘。平常它们多藏匿在土墩旁低洼处的草丛中，像无鸟存在，但当受到惊动，则见急速、紧张地从低洼处站移到草墩上观望、鸣叫，顿时热闹非凡，很是有趣；叫声悦耳、宏亮；较胆大，若人不临得太近，一般不飞，飞时也不远去，也不高飞。

杂食性，主要以草籽为食。另外，我们在其胃内也检到青稞和甲虫等。

据 Baker (1926)、Ali (1946), Ali et Ripley (1972) 曾都记载过它们在西藏西部玛法木湖周围和西藏中部纳木湖收集到的繁殖材料。在玛法木湖、丁湖、姜叶马湖地区，观察到它们在六月间繁殖。一个巢两枚卵，量度为 28 × 20 和 28 × 21 毫米，另一个巢（采于 6 月 27 日）已有三只雏鸟，约为 8 日龄。

在纳木湖记载的材料它们繁殖盛期为 6—7 月，巢成碗形，筑于地面的浅土穴里，位于较干燥的土墩之间，边缘多为海绵状的沼泽，这些地方不易受到人和其它动物干扰和侵