

额、头顶前部、眉纹、颊、颈侧白色；头顶后部和颈项黑色；从口角经眼具一黑纹，与枕  
实等。

外具加尔，朝鲜北部，冬季从中国长江流域往南至中南半岛，阿萨姆，孟加拉国，菲律宾，  
等（繁殖鸟，留鸟）。国外分布于苏联的西伯利亚北部和东部，南至堪察加半岛，乌苏里，  
等以南地区，西抵四川西南部，西藏德仁，加拉，羌纳，云南西部，海南岛（旅鸟，冬候鸟）；今  
西南部朝阳，宁夏，青海东部（旅鸟）；河北（旅鸟，少数冬候鸟）；陕西南部，河南，山东，江苏  
内蒙古西北部呼伦贝尔，东北部林西，东北部小兴安岭，中部哈尔滨，南部沈阳、  
内蒙古

#### (6) 东嘴眼纹亚种 *Motacilla alba ocularis Swinhoe*

*Motacilla bairdiana Swinhoe*, 1871, Proc. Zool. Soc. London: 363 (模式产地：亚洲东部)。

♀♂(10)	19.6	173.6	13.4	88.5	92.1	23.5
(15—22)	(163—190)	(11.5—17)	(76—93)	(64.5—101)	(22—26)	
♀♂(10)	21.9	179.5	12.5	86.1	85.8	21.1
	(19—29)	(162—196)	(11—16)	(87—97)	(76—95)	(19—24)

量衡表：

虹膜褐色；嘴、脚趾和趾黑色。

灰。

幼鸟上体橄榄灰色，头和颈部分呈深橄榄灰色；下体胸腹部暗灰沾褐，余羽白色，两胁沾

但不与颈部黑色相连，*personata* 颈部的黑色和胸部分的黑色相连；下体余部白色。

褐色，外翈羽缘白色；喉白色，而 *dubuhensis* 和 *personata* 喉黑色，胸部具一大黑斑，  
其内翈羽缘近尾基处具褐色；两翼内翈羽缘黑色，大覆羽白色，内翈具黑色斑纹，飞羽黑  
褐色，尾上覆羽近黑色，近尾基的尾上覆羽外翈白色；尾羽黑色，最外侧两对尾羽白色，  
额、眼周及头侧白色；无掌眼黑色，与掌掌眼黑色的 *ocularis* 相区别；头顶至颈部分黑色，  
它地区。

内蒙古，蒙古北部，宁夏北部，甘肃、青海、陕西，南至吉林达乌里，东北部，中南半岛其  
北部、东南部，阿富汗北部，往东从外贝加尔经阿穆尔至布拉戈维申斯克等地。冬季在伊朗  
扎拉河谷，蒙古戈壁北部，往东从外贝加尔经阿穆尔至布拉戈维申斯克等地。冬季在伊朗  
布于苏联西伯利亚中部和东南部，南至贝加尔湖，西至蒙古的杭爱山，经外贝加尔至肯特、  
帕米尔，向东至陕西，河北，山东，江苏（旅鸟）；四川，云南，贵州，广西，广东（冬候鸟）。国外分  
布于西南部半干旱、林带、灌木、类鸟带、间普、开密，四川西北部石渠、中部宝兴以至西南  
部及中部包头，甘肃西北部弱水，青海东部，南部及柴达木盆地，西藏南部、昌都地区北  
内蒙古北部呼伦贝尔，西北部大兴安岭（繁殖鸟）；东北西南部朝阳，内蒙古东南部  
内蒙古

#### (5) 东北亚种 *Motacilla alba bairdiana Swinhoe*

*Motacilla madagascariensis Gmelin*, 1789, Syst. Nat., ed. 13, I: 961 (模式产地：印度)。

des 额与头顶前部均白，眼后有白色眉纹。余羽两亚种则相近似。

额黑、白色眉纹自鼻孔基部起向后延伸至头顶两侧，此一特征与 *alboides* 相区别，*alboides*