

新疆北部青河,塔什库尔干、福海(旅鸟,繁殖鸟);四川西部康定、北部红原、西北部达

(4) 北方西部亚种 *Motacilla flava beeema* (Sykes)

Budytis melanogriseus Homeyer, 1878, Journ. Orn. 26: 128 (模式产地: 印度)。

性别	体重	翅	♂(1)	15.5	78
----	----	---	------	------	----

量衡度:

头顶黑色,上体黄绿色;翅和尾均暗褐,下体黄色,腹白(霍清华等,1964)。

阿富汗、俾路支迁徙到印度西北部,偶而至孟买南部,甚至印度的贝纳勒斯。

分布于新疆伊犁(霍清华等,1964)及天山(繁殖鸟)。国外见于苏联,冬季经伊朗东部,

(3) 天山亚种 *Motacilla flava melanogrisea* (Homeyer)

北部的 Nihni Kolymsk)。

Budytis flava Thayer et Bangs, 1914, Proc. New Engl. Zool. Cl. 5:41 (模式产地: 西伯利亚东

♀(1)	18	183	12	83	87	31
------	----	-----	----	----	----	----

量衡度:

头顶灰色,并具深色羽缘,最外侧两对尾羽均具较大的楔状白斑;下体呈淡黄色。

腹部;翅灰黑色,具白色羽缘,中覆羽和大覆羽的淡色羽缘形成两道翼上横斑;尾羽黑

色,并具深色羽缘,最外侧两对尾羽均具较大的楔状白斑;下体呈淡黄色。

头顶灰色,眉纹不太明显,耳羽近黑色,背灰色,而 *macronyx* 无眉纹,耳羽暗灰,背概

区。冬季多在印度。

分布于东北的西北部、中部哈密,四川和湖北(旅鸟)。国外分布于苏联西伯利亚地

(2) 银北亚种 *Motacilla flava plexa* (Thayer et Bangs)

Budytis leucoccephala Przevalski, 1877, Ibis (5)5: 408 (模式产地: 新疆准噶尔盆地)。

虹膜褐色;嘴角黑色;脚黑色。

色。

头颈项黑色,具深色羽缘,最外侧两对尾羽均具较大的楔状白斑;下体余部黄

色;翅黑色,尾羽黑色,具深色羽缘,最外侧两对尾羽均具较大的楔状白斑;下体余部黄

色;头颈项白色,与 *melanogrisea* 头顶黑色显然有别;耳羽和头顶后部沾灰,背羽概概灰

色。在蒙古西北部或准噶尔盆地的西北部(旅鸟),偶而在苏联的吉尔吉斯繁

殖。国外分布于蒙古、苏联、伊朗、阿富汗、印度、巴基斯坦等地。

(1) 准噶尔亚种 *Motacilla flava leucoccephala* (Przevalski)

头颈项黑色;眉纹较黑;耳羽深灰褐色.....阿拉善加亚种 *M. f. tschutschensis*

头颈项黑色;眉纹较黑;耳羽浅灰褐色.....塔里木加亚种 *M. f. similisima*

头颈项黑色;眉纹较黑,耳羽近黑,有时杂以白色.....北方东部亚种 *M. f. angarensis*

5. 头颈项黑色;眉纹较黑;耳羽暗灰.....北方西部亚种 *M. f. beeema*

5. 头颈项黑色;眉纹较黑;耳羽较黑.....东北亚种 *M. f. macronyx*

4. 无眉纹;耳羽暗灰.....3. 背灰;耳羽近黑.....银北亚种 *M. f. plexa*

背较绿或呈橄榄绿色.....

楚河上游；西藏南部狮泉河、噶尔县、普兰、八宿、然乌（旅鸟）。国外分布于苏联东南部、伏尔加河和乌拉尔南部的草原，向东横穿吉尔吉斯草原和西伯利亚草原，至克拉斯诺亚地区和叶尼塞河上游。冬季在印度、锡金，东至阿萨姆，南至马来亚，少量在东非、肯尼亚、乌干达等地。

形态详见种的描述。

Budytes beema Sykes, 1832, Proc. Comm. Sci. Corr. Zool. Soc. London 2:90 (模式产地：印度 Dukhun)。

(5) 北方东部亚种 *Motacilla flava angarensis* (Sushkin)

分布于北京，河北天津、新安，贵州北部，四川西南部会东，云南南部思茅及西双版纳（旅鸟）。国外见于苏联、蒙古等地，冬季在老挝、越南、缅甸、泰国北部。

额、头顶较 *beema* 暗，呈深灰色，眉纹较狭，眼先及耳羽灰黑色，而 *beema* 头顶蓝灰，眉纹较宽，耳羽暗蓝灰色；上体橄榄绿色，两翼黑褐色，各羽均具乳黄色羽缘，大覆羽和三级飞羽的乳黄色羽缘形成两道较明显的翼斑；尾羽黑色，各羽具乳黄色羽缘，中央尾羽的羽缘较宽，外侧两对尾羽的端部具大形的楔状白斑；颏白色，下体余部鲜黄，胸侧及两胁沾橄榄黄。

虹膜褐色；嘴、跗蹠、爪黑色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
	16,18	155,164	11,11.5	78,80	73,79	23,23
♂♂(3)	20	175	12.5	80	79	24
♀♀(2)	18,19	160,173	12,13	74,75	71.5,73	23,25
♀(1)	15.5	160	11	80	71	23.5

[*Budytes flava*] *angarensis* Sushkin, 1925, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 38:33 (模式产地：西伯利亚 Sharagolskaia, Transbaikalia)。

(6) 东北亚种 *Motacilla flava macronyx* (Stresemann)

分布于内蒙古中部陕坝、东北部呼伦贝尔盟，东北北部齐齐哈尔、中部哈尔滨和帽尔山，甘肃兰州（繁殖鸟、旅鸟）；河北，陕西，山东，湖北，江苏，浙江，四川，云南，西藏然乌（旅鸟）；福建，广东包括海南岛，广西（旅鸟，冬候鸟）。国外分布于苏联乌苏里，往西至外贝加尔东南至赤塔，南至蒙古，冬季经朝鲜北部至印度、缅甸、泰国、马来亚半岛和苏门答腊。

额灰褐色、头顶黑色沾橄榄褐绿色，眼区较淡；无眉纹，此一特征与具有白色眉纹的 *beema*、*angarensis*、*simillima* 相区别。颈及背部暗灰色，并沾橄榄褐绿色，尾上覆羽较淡；翅黑褐，初级飞羽具白色狭缘，大覆羽和三级飞羽具较宽的白色羽缘，形成两道较明显的翼斑；尾黑色，具白色狭缘，最外侧两对尾羽端部具大形的楔状白斑，颏白色沾褐，胸部呈黄褐色，具不太明显的深褐色横斑，腹部灰白色。

虹膜褐色；嘴、脚黑色。

量衡度：