

先，余每——相繼死去。主食昆虫。根據 1 月 (5 只)、2 月 (7 只)、3 月 (3 只)、4 月 (15 只)、5 月 (7 只)、6 月 (15 只)、7 月 (4 只)、8 月 (1 只) 和 9 月 (4 只) 來自雲南的 61 只鳥胃分析結果，所食以昆虫占主要成分。計有鱗翅目幼虫 (20 次)、鱗翅目昆蟲和直翅目昆蟲、鱗翅目昆蟲和直翅目昆蟲、鱗、蝶類等 (各 4 次) 等，還有瓢虫、双翅目蠅类和同翅目蠅类等 (各 2 次)、董火虫、蝶类及其幼虫 (各 1 次)、其它昆蟲幼虫或蛹 (11 次)，蜘蛛 (1 次)；植物性食物有果实 (3 次)、种子 (2 次)、草茎 (1 次) 和叶片 (1 次)。來自貴州 (3 月) 的鳥胃內含物有虫、蝗虫及其他昆蟲 (各 1 次)。來自貴州 (3 月) 的鳥胃內含物有虫、蝗虫及其他昆蟲 (各 1 次)、草茎 (1 次) 和叶片 (1 次)。有少量植物种子 (胡鴉米等，1973)。郭盛 4 月和 5 月來自雲南的 7 只鳥胃，內含物純為昆蟲，有鱗翅目昆蟲幼虫、蝶类、網紋金龟虫以及其他昆蟲。

**生态** 植于海拔约2,100米以下的山地和平原的雨林、季雨林、次生阔叶林，也见于林  
中草地或开垦的耕地。繁殖季节大都成对。在云南，多次观察得雄鸟在  
4月间仍单独活动，5月间亦有成群活动的现象。性活泼，喜结集于乔木灌木觅食，少见停  
息。曾见与灰喉山椒鸟和粉红山椒鸟混群活动，或与其它鸟混群。鸣声尖细而单调，如  
“spec-spec”，多在飞行时且鸣，停息时甚少鸣唱。当由一树转移到另一树时，常有一短颤

**生态** 植于海拔约2,100米以下的山地和平原的雨林、季雨林、次生阔叶林，也见于松

*Pericrocotus fraterculus* Swinhoe, 1870. Ibis (2) 6: 244 (模共产地：海南岛)。

量衡度:

虹膜暗褐；嘴和脚黑色。

尾上覆羽以及下体黄色浓艳鲜亮。

海南鳽(留鳥)。据 Ai 等 (1971)，此鸟分佈在印度东北部阿薩姆和孟加拉国(?)。

(3) 海南亚种 *Pericrocotus flammeus fraternalis Swinhonis*

*Ptericrocoetus speciosus* of *Hertw.* 1910, Op. Bacth. (蒙古) 地區：福建南平府延平縣。

性別	体重	全长	吻鱗	吻鱗	尾	附蹠	(12)
34.9	210.8	14.8	101.3	105.0	17.9		(30-51)
31.0	210.3	14.4	99.8	102.5	17.3		(196-221)
♀♀(12)							(98-105.5) (96-112.5) (16.5-19)
31.0	210.3	14.4	99.8	102.5	17.3		(25-33) (196-225) (13.5-15.5) (95-103) (16-18.5)

量衡度量衡

虹膜深褐色；嘴和脚黑色。

側錄也更為显著。

种的区别在于腰和尾上覆羽沾黄色多绿色；尾及外侧两片飞羽黑色，并缀以绿色。